

REPÚBLICA DEL PERÚ



## Resolución Jefatural

Lima, 17 de ENERO del 2011



**VISTOS;** El Informe Nº 004-2011-DNCC-DICON/INEN, emitido por el Jefe del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos de la Dirección de Control del Cáncer del INEN y el Informe Nº 116-2010-DIMED-DOM/INEN, emitido por e Coordinador de Validación de las Guías Clínicas;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Ley Nº 28748 se creó como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN, con personería jurídica de derecho público interno con autonomía, entre otros, de carácter normativo, adscrito al Sector Salud;



Que, el Artículo 37-Aº del Reglamento de la Ley Nº 27657 - Ley del Ministerio de Salud, aprobado con Decreto Supremo Nº 013-2002-SA y sus modificatorias precisan que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN tiene como misión proteger, promover, prevenir y garantizar la atención integral del paciente oncológico, dando prioridad a las personas de escasos recursos económicos; así como, controlar, técnica y administrativamente, a nivel nacional los servicios de salud de las enfermedades neoplásicas, y realizar las actividades de investigación y docencia propias del Instituto;



Que, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INEN aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2007-SA, precisa en el Artículo 3º su autonomía normativa en el extremo de normar técnicamente la promoción, prevención, diagnóstico, manejo, rehabilitación y seguimiento del cáncer en el País, dentro del marco de las políticas sectoriales, refiriéndose éstas como "normas técnicas oncológicas"; ello en concordancia con lo establecido por el literal g) del Artículo 6º del ROF que precisa como función general del INEN el Innovar, emitir y difundir, a nivel nacional, las normas, guías, métodos, técnicas, indicadores y estándares de los procesos de promoción de la salud, prevención de enfermedades neoplásicas, recuperación de la salud, rehabilitación y otros procesos relacionados específicamente con el campo oncológico;



Que, del mismo modo, el Artículo 24º del ROF precisa que la Dirección de Control del Cáncer es el órgano técnico-normativo encargado de planificar, proponer las normas y conducir, a nivel nacional, los procesos de promoción de la salud en el campo oncológico, de prevención de enfermedades neoplásicas, de epidemiología, de información para la salud, de investigación en oncología y de docencia y educación especializada en oncología; así como de conducir la formulación, sistematización y difusión de las normas técnicas oncológicas y de los estándares de calidad de los

servicios de salud oncológicos a nivel nacional, a los que controla técnicamente en cumplimiento a las normas vigentes;

Que, en ese orden de ideas, mediante el documento de visto se ha presentando para su aprobación las "Guías Clínicas en base a la Guía del NCCN Cáncer de Cuello Uterino", la misma que cuenta con el visto bueno de la Dirección de Control del Cáncer y sus unidades orgánicas, por lo que es necesario oficializar la misma como una norma técnica oncológica de carácter referencial para su difusión y aplicación institucional en cumplimiento de las normas precitadas;



En uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones del INEN, en concordancia con lo establecido en el literal g) de su Artículo 6º;



**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar las "**GUÍAS CLÍNICAS EN BASE A LA GUÍA DEL NCCN CANCER DE CUELLO UTERINO**", la misma que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Encargar la difusión de la presente Resolución a la Dirección de Control del Cáncer en el marco de la autonomía normativa del INEN conforme a su Ley de creación.



**ARTÍCULO TERCERO:** Encargar su publicación en el Portal Web Institucional a la Oficina Ejecutiva de Comunicaciones de la Secretaría General del INEN.




**ARTÍCULO CUARTO:** Déjese sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

  
Dr. Carlos Vallejos Sologuren  
Jefe Institucional



DR. MANUEL MÁRQUEZ LARRAONDO  
DIRECTOR (el)



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEONASICAS  
MANUEL MÁRQUEZ LARRAONDO

Guías Clínicas en base a la Guías del NCCN

# Cáncer de Cuello Uterino

v.1.2010

Continua

## Cáncer de Cuello Uterino

### Panelistas del NCCN Para Cáncer de Cuello Uterino

\* Benjamin E. Greer, MD/Co-Chair  
Fred Hutchinson Cancer Research  
Center/Seattle Cancer Care Alliance

\* Wui-Jin Koh, MD/Co-Chair §  
Fred Hutchinson Cancer Research  
Center/Seattle Cancer Care Alliance

Nadeem R. Abu-Rustum, MD ♀  
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Sachin M. Apte, MD, MS ♀  
H. Lee Moffitt Cancer Center  
& Research Institute

Michael A. Bookman, MD †  
Fox Chase Cancer Center

Robert E. Bristow, MD ♀  
The Sidney Kimmel Comprehensive  
Cancer Center at Johns Hopkins

Susana M. Campos, MD, MPH, MS †  
Dana-Farber/Brighton and Women's  
Cancer Center

John Chan, MD ♀  
UCSF Helen Diller Family  
Comprehensive Cancer Center

Kathleen R. Cho, MD #  
University of Michigan  
Comprehensive Cancer Center

Larry Copeland, MD ♀  
The Ohio State University Comprehensive  
Cancer Center - James Cancer Hospital  
and Solove Research Institute

Marta Ann Crispens, MD ♀  
Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Nefertiti duPont, MD, MPH ♀  
Roswell Park Cancer Institute

Patricia J. Eifel, MD §  
The University of Texas  
M. D. Anderson Cancer Center

Warner K. Huh, MD ♀  
University of Alabama at Birmingham  
Comprehensive Cancer Center

Daniel S. Kapp, MD, PhD §  
Stanford Comprehensive Cancer Center

John R. Lurain, III, MD ♀  
Robert H. Lurie Comprehensive Cancer  
Center of Northwestern University

Mark A. Morgan, MD ♀  
Fox Chase Cancer Center

Robert J. Morgan, Jr., MD † ‡  
City of Hope  
Comprehensive Cancer Center

Steven W. Remmenga, MD ♀  
UNMC Eppley Cancer Center at  
The Nebraska Medical Center

R. Kevin Reynolds, MD ♀  
University of Michigan  
Comprehensive Cancer Center

Angeles Alvarez-Secord, MD ♀  
Duke Comprehensive Cancer Center

William Small, Jr., MD §  
Robert H. Lurie Comprehensive Cancer  
Center of Northwestern University

Nelson Teng, MD, PhD ♀  
Stanford Comprehensive Cancer Center

Ω Oncología Ginecológica  
† Oncología Médica  
‡ Hematología  
§ Radioterapia/RT oncológica  
# Patología  
\* Miembro del Comité Editor

**Continúa**

## Guías de Práctica en Oncología – v.1.2010

## Cáncer de Cuello Uterino

Índice de Recomendaciones  
TDC de Cáncer de Cuello Uterino  
Estadificación, Discusión, Referencias

### Tabla de Contenidos

Miembros del panel del NCCN para Cáncer de Cuello Uterino

Resumen de Actualizaciones de Recomendaciones

Estadios Clínicos (CERV-1)

Estadio IA1 (CERV-2)

Estadio IA2, IB1, y Estadio IIA ( $< 4$  cm.) (CERV-3)

Estadio IB2 y Estadio II A ( $> 4$  cm.) (CERV-2)

Estadio Bulky Seleccionado IB2, II A, y Estadios II B, III A, III B, IV A (CERV-4)

Hallazgo incidental De Cáncer invasivo en Histerectomía Simple (CERV-7)  
Vigilancia (CERV-8)

Recurrencia Local/Regional (CERV-9)

Metástasis a Distancia (CERV-10)

Regímenes de Quimioterapia Para Cáncer de Cuello Uterino (CERV-A)

Índice de Recomendaciones

Impresión de las Recomendaciones Para Cáncer de Cuello Uterino

Por ayuda en el uso de estos documentos, por favor hacer click aquí

Estadificación

Discusión

Referencias



Ensayos clínicos: El NCCN cree que el mejor manejo para cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. Se incentiva de manera particular a la participación en los ensayos clínicos.

Para encontrar los ensayos clínicos on-line de las instituciones miembros del NCCN, haga click aquí: [nccn.org/clinical\\_trials/physician.html](http://nccn.org/clinical_trials/physician.html)

Niveles de Evidencia y Consenso del NCCN: Todas las recomendaciones son Categoría 2A a menos que se especifique lo contrario.  
Vea Niveles de Evidencia y Consenso del NCCN.

Las Guías del NCCN Para Cáncer de Cuello Uterino incluyen el manejo del carcinoma de células escamosas, carcinoma adenoescamoso, y adenocarcinoma de cervix.

Estas Guías son una declaración de los niveles de evidencia y consensos de los autores respecto a sus puntos de vista y opiniones acerca de los estándares de tratamiento actualmente aceptados. Cualquier clínico que deseé aplicar o consultar estas guías debe usar independientemente su juicio clínico en el contexto de cada circunstancia clínica en particular para determinar cualquier tratamiento en un paciente. El NCCN no representa, ni garantiza el uso o aplicación de su contenido y deslinda cualquier sentido. Estas guías están registradas bajo los derechos de autor del NCCN. Todos los derechos reservados. Esta prohibida la reproducción de estas guías y sus ilustraciones bajo cualquier forma, sin el consentimiento expreso por escrito del NCCN. © 2009.



## Resumen de las Actualizaciones de las Recomendaciones

El resumen de cambios en la versión 1.2010 de las Recomendaciones del Cáncer de Cuello Uterino de la versión 1.2009 incluye:

(Título de Contenidos):




- La siguiente afirmación se agregó, "Las Guías del NCCN del Cáncer de Cuello Uterino incluyen el manejo de carcinoma de células escamosas, carcinoma adenoescamosa, y adenocarcinoma de cervix."

### CERV-2:

- La nota al pie "C" que indica, "La quimioterapia basada en Cisplatino concurrente con RT utiliza Cisplatino como un agente único o Cisplatino más Fluorouracilo" se aumentó para clarificación.

### CERV-A: Los Regímenes de Quimioterapia para Cáncer de Cuello Uterino Recurrente o Metastásico

- Terapia de combinación de primera línea: "Cisplatino/Paclitaxel" cambió de Categoría 2A a Categoría 2A
- Possible Terapia de Primera Línea con agentes únicos: Después de "Cisplatino", el panel aumentó "preferido como un agente simple".
- Gemcitabina y Topotecan se eliminaron de "Possible terapia de primera línea como agentes únicos" y se adicionó en "Terapia de Segunda Línea".



Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique lo contrario.  
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.

## ACTUALIZACIONES


Versión 1.2010 - 07/2010 a 2012 - NCCN - National Comprehensive Cancer Network - All rights reserved. Traducción autorizada por el Comité de Traducción de la Sociedad Argentina de Oncología (SAO).

## Guías de Práctica en Oncología – v1.2010

## Cáncer de Cuello Uterino

### PLAN DE TRABAJO

### ESTADIO CLÍNICO





## Guías de Práctica en Oncología – v.1.2010

# Cáncer de Cuello Uterino

Índice de Recomendaciones


TDC de Cáncer de Cuello Uterino  
Estadificación, Discusión, Referencias



CERV-2

Cáncer de Cuello Uterino

## HALLAZGOS QUIRÚRGICOS TRATAMIENTO ADYUVANTE




• La quimioterapia basada en Cisplatino concurrente con RT utiliza Cisplatino como un agente único o Cisplatino más Fluorouracilo. • Yea los Requerimientos de Quimiorradiación Para Cáncer de Cuello Uterino Recurrente o Metastásico. [CERV-A].

Note: Tridac las recomendaríase acción en la categoría 2A a medida que se intensifica el efecto form.

**Nota:** Todas las recomendaciones están en la categoría 2B a menos que se indique de otra forma.

ESTADIO CLÍNICO

TRATAMIENTO PRIMARIO



<sup>c</sup> La quimioterapia basada en Cisplatino concurrente con RT utiliza Cisplatino como un agente único o Cisplatino más Fluorouracilo.

• RT pélvica + braquiterapia con dosis total al punto A.  $\geq$  85 Gy.

**Nota :** Todas las recomendaciones están en la categoría 2a a menos que se indique de otra forma.

**Ensayos Clínicos.** NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La nutrición en envases clínicamente documentada


## Guías de Práctica en Oncología – v.1.2010

**BULKY SELECCIONADO** Estadio IB2, IIA ( $> 4$  cm);  
Estadio IIIB, IIIA, IIIB, IVA  
**ESTADO GANGLIONAR**

## Cáncer de Cuello Uterino

Índice de Recomendaciones  
NCCN de Cáncer de Cuello Uterino  
Estatificación, Discusión, Referencias

### TRATAMIENTO PRIMARIO



\* La quimioterapia basada en Cisplatino utilizada concurrentemente con RT debe utilizar Cisplatino como agente único o Cisplatino más Fluorouracilo.

† Vea Requerimientos de Quimioterapia para Cáncer de Cuello Uterino Recurrente o Metastásico (CERV-A).

‡ RT pélvica + braquiterapia con dosis total al punto A  $\geq 85$  Gy.

Dosis de RT es 45-50 Gy al volumen de tumor clínico (CTV).

Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique de otra forma.  
Ensayos Clínicos : NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.

## Guías de Práctica en Oncología – v.1.2010

# Cáncer de Cuello Uterino

Índice de Recomendaciones

INCC de Cáncer de Cuello Uterino


Estatificación, Discusión, Referencias

**BULKY SELEC.**, Estadio IB2, IIA ( $> 4$  cm);


Estadio IIIB, IIIA, IIIB, IVA

**RESULTADOS DE IMÁGENES**

### TRATAMIENTO PRIMARIO



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES MÉDICAS INEN  
Departamento de Oncología



División de Enfermedades del Cervix

Versión 1 - 2010 | CERV-8 © 2008 National Compendium Cancer Network, Inc. All rights reserved. These guidelines are intended for use by healthcare professionals in the United States and are not intended for use outside the United States or outside the jurisdiction of NCCN.  
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.

• 10  
CERV-8


## Guías de Práctica en Oncología – v.1.2010

## Cáncer de Cuello Uterino

HALLAZGO INCIDENTAL DEL  
CÁNCER INVASIVO EN LA  
HISTERECTOMÍA SIMPLE


Estadio IA1 → Revisión de lámina → No hay invasión del espacio linfovascular

Márgenes negativos; imágenes negativas → RT pélvica + Braquiterapia ± Quimioterapia Concurrente que contiene Cisplatino<sup>a</sup>



• Examen físico  
• Hemograma, bioquímicos  
• Estudios de función hepática/  
función renal  
• Imágenes topográficas para ≤ estadio  
IB1 incluyendo rayos X de tórax,  
exploración, TC/RMN  
Opcional (≥ Estadio IB2):  
• Cistoscopia/proctoscopia EUA<sup>b</sup>

Estadio IA1 con invasión del espacio linfovascular o ≥ Estadio IA2



<sup>a</sup> Por sospecha de compromiso de vejiga/intestinos, se requiere cistoscopia/proctoscopia con biopsia.

<sup>b</sup> La quimioterapia basada en Cisplatino concurrente con RT utiliza Cisplatino como un agente único o Cisplatino más Fluorouracilo.

<sup>c</sup> Cáncer invasivo en el margen quirúrgico.

Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique de otra forma.

Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.

Vea Vigilancia (CERV-8)


## Guías de Práctica en Oncología – v.1.2010

# Cáncer de Cuello Uterino

Índice de Recomendaciones  
TC de Cáncer de Cuello Uterino  
Estatificación, Discusión, Referencias

## VIGILANCIA

## PLAN DE TRABAJO



Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique de otra forma.  
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.

Versión 1.2010 - 15/2009 © 2006 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. This publication does not reflect the opinions or views of NCCN.


ESTÁNDAR DE SERVICIOS NACIONAL  
NATIONAL STANDARD OF CARE  
NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK, INC.  
NCCN

12

CERV-8

## Cáncer de Cuello Uterino

### TERAPIA PARA RECURRENCIA




Vea Recomendaciones de Quimioterapia para Cáncer de Cuello Uterino Recurrente o Metástásico (CERV-A).

Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique de otra forma.

Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.

## TERAPIA PARA RECURRENCIA



<sup>d</sup> Vea Regímenes de Quimioterapia Para Cáncer de Cuello Uterino Recurrente o Metastásico (CERV-A).

Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique de otra forma.  
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.

versión 1.2010 | 12/2009 | NCCN | National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. This publication is intended for health professionals and is not a substitute for the expertise and judgment of healthcare providers or of NCCN.

**REGÍMENES DE QUIMIOTERAPIA PARA CÁNCER CERVICAL RECURRENTE O METASTÁSICO**  
(Considere fuertemente ensayo clínico)

Terapia de primera línea  
Agentes Combinados

- Cisplatino/Paclitaxel (Categoría 1)<sup>1</sup>
- Carboplatino/Paclitaxel
- Cisplatino/Topotecan
- Cisplatino/Gemcitabina (Categoría 2B)

Possible terapia de primera línea

Agente único

- Cisplatino (preferido como un agente único)
- Carboplatino



Terapia de segunda línea  
(Todos los agentes son Categoría 2B)

- Bevacizumab
- Docetaxel
- Epirubicina
- 5-FU (5-Fluorouracilo)
- Gemcitabina
- Ifosfamida
- Irinotecan
- Doxorubicina liposomal
- Mitomicina
- Pemetrexed
- Topotecan
- Vinorelbina

<sup>1</sup> Monk BJ, Sill MW, McMeekin DS, et al. Phase III trial of four cisplatin-containing doublet combinations in stage IVB, recurrent, or persistent cervical carcinoma: A Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol 2009; 27: 8909.

Nota : Todas las recomendaciones están en la categoría 2A a menos que se indique de otra forma.  
Ensayos Clínicos: NCCN cree que el mejor manejo de cualquier paciente con cáncer es en un ensayo clínico. La participación en ensayos clínicos especialmente fomentada.

Verde: <20% de acuerdo; Amarillo: 21-50%; Naranja: 51-75%; Rojo: >75%. Tercera bandera: azul. Una sola bandera indica que solo una de las recomendaciones fue respaldada por la evidencia disponible en ese momento. Una segunda bandera indica que las recomendaciones fueron respaldadas por la evidencia disponible en ese momento.



## Cáncer de Cuello Uterino

### Estadificación

#### Estadificación

**Tabla 1**

International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) y los Sistemas de Evaluación Quirúrgica para Tumor-Ganglio-Metástasis (TNM) para Cáncer de Cuello Uterino \*

Estadios FIGO	Hallazgos Quirúrgico-Patológicos	Categorías TNM	
0	El tumor primario no puede evaluarse No hay evidencia de tumor primario Carcinoma <i>in situ</i> (carcinoma pre-invasivo)	TX T0 Tis	
I	Carcinoma de cuello uterino confinado al útero (extensión al corpus no debe considerarse). Carcinoma invasivo diagnosticado sólo por microscopía. Todas las lesiones visibles macroscópicamente— incluso con invasión superficial—son estadio IB/T1b.	T1 T1a T1b	Ganglios Linfáticos Regionales (N) NX Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales. N1 Metástasis en los ganglios linfáticos regionales
IA1	Invasión estromal de 3.0 mm o menor en profundidad 7.0 mm o menor en extensión horizontal Invasión estromal de más de 3.0 mm y no mayor a 5.0 mm con una extensión horizontal de 7.0 mm o menor.	T1a1 T1a2	Metástasis Distante (M) MX La metástasis a distancia no puede evaluarse. M0 No hay metástasis a distancia. M1 Metástasis a distancia.
IB	Lesión clínicamente visible confinada al cérvix o lesión microscópica mayor a 1A2/T1a2.	T1b T1b1 T1b2	*Reimpreso de: Benedet JL, Bender H, Jones H 3 <sup>rd</sup> , et al. FIGO staging classifications and clinical practice guidelines in the management of gynecologic cancers. FIGO Committee on Gynecologic Oncology. Int J Gynaecol Obstet 2000;70:209-262. Copyright © 2000, con permiso de la International Federation of Gynecology and Obstetrics.
IB1	Lesión clínicamente visible de 4.0 cm o menor en su mayor dimensión.	T1b1	
IB2	Lesión clínicamente visible de más de 4.0 cm en su mayor dimensión.	T1b2	
II	El tumor invade más allá del útero pero no a la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. Sin invasión del parametrio. Con invasión del parametrio.	T2 T2a T2b	<sup>†</sup> La profundidad de la invasión no debe ser mayor a 5 mm, tomado de la base del epitelio, superficie o ganglionar, de donde se origina. La profundidad de la invasión se define como la medida del tumor de la unión epitelial-estromal de la papila epitelial adyacente más superficial al punto más profundo de invasión. El compromiso del espacio vascular, venoso o linfático, no afecta la clasificación.
IIA			
IB			

Estadificación			
III	El tumor se extiende a la pared pélvica y/o compromete el tercio inferior de la vagina y/o causa hidronefrosis o mala función del riñón	T3	
III A	El tumor compromete el tercio inferior de la vagina, no hay extensión en la pared pélvica	T3a	
III B	El tumor se extiende a la pared pélvica y/o causa hidronefrosis o mala función del riñón	T3b	
IVA	El tumor invade la mucosa de la vejiga o recto, y/o se extiende más allá de la pelvis menor. La presencia de edema bullar no es suficiente para clasificar un tumor como T4	T4	
IVB	Metástasis a distancia.	M1	
	Ganglios Linfáticos Regionales (N)		
NX	Los ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse		
N0	No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales.		
N1	Metástasis en los ganglios linfáticos regionales		
	Metástasis Distante (M)		
MX	La metástasis a distancia no puede evaluarse.		
M0	No hay metástasis a distancia.		
M1	Metástasis a distancia.		
	*Reimpreso de: Benedet JL, Bender H, Jones H 3 <sup>rd</sup> , et al. FIGO staging classifications and clinical practice guidelines in the management of gynecologic cancers. FIGO Committee on Gynecologic Oncology. Int J Gynaecol Obstet 2000;70:209-262. Copyright © 2000, con permiso de la International Federation of Gynecology and Obstetrics.		
	<sup>†</sup> La profundidad de la invasión no debe ser mayor a 5 mm, tomado de la base del epitelio, superficie o ganglionar, de donde se origina. La profundidad de la invasión se define como la medida del tumor de la unión epitelial-estromal de la papila epitelial adyacente más superficial al punto más profundo de invasión. El compromiso del espacio vascular, venoso o linfático, no afecta la clasificación.		

## Discusión

### Categorías del NCCN de Evidencia y Consenso

**Categoría 1:** La recomendación se basa en la evidencia de alto nivel (ej. Ensayos clínicos controlados randomizados) y hay consenso uniforme del NCCN.

**Categoría 2A:** La recomendación se basa en la evidencia de menor nivel y hay consenso uniforme del NCCN.

**Categoría 2B:** La recomendación se basa en la evidencia de menor nivel y hay consenso no uniforme del NCCN (pero sin mayor desacuerdo).

**Categoría 3:** La recomendación se basa en cualquier nivel de evidencia pero desacuerdo.

**Cualquier recomendación es de categoría 2A a menos que se diga lo contrario.**

## Generalidades

Un estimado de 11 270 nuevos casos de cáncer de cuello uterino se diagnosticarán en los Estados Unidos en el año 2009; 4 070 muertes resultarán de la enfermedad.<sup>1</sup> Las tasas de cáncer de cuello uterino están disminuyendo entre las mujeres en todos los grupos raciales y étnicos en los Estados Unidos, aunque la incidencia se mantiene alta entre las mujeres Hispanas/Latinas.<sup>2,3</sup> Sin embargo, el cáncer de cuello uterino es un problema de salud mayor mundial para las mujeres. La incidencia mundial anual de cáncer de cuello uterino para el 2002 fue 493 243; la tasa de muerte anual fue 273 505. Es el tercer cáncer más común en mujeres a nivel mundial.<sup>4,5</sup> 78% de los casos ocurren en países en desarrollo, donde el cáncer de cuello uterino es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en las mujeres.

Se piensa que la declinación substancial en la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino, en países desarrollados, es el resultado de una efectiva evaluación. La infección persistente de papilomavirus

humano (HPV) se considera como el factor más importante que contribuye al desarrollo del cáncer de cuello uterino. Parece haber una relación entre la incidencia del cáncer de cuello uterino y la prevalencia de HPV en la población. La prevalencia de HPV crónico en países con una alta incidencia de cáncer de cuello uterino es de 10% a 20%, mientras la prevalencia en países de baja incidencia es 5% a 10%.<sup>4</sup> La inmunización contra HPV (Usando Gardasil o Cervarix, que están aprobadas por el Food and Drug Administration [FDA] de EEUU) previene de la infección persistente con ciertos tipos de HPV y, así, se espera prevenir cáncer específico de HPV en mujeres (vea "Vacunación Contra HPV").<sup>6-10</sup> Otros factores de riesgo epidemiológicos asociados con el cáncer de cuello uterino son una historia de fumador, paridad, uso anticonceptivo, edad temprana en el inicio del coito, número grande de parejas sexuales, historia de enfermedad sexualmente transmitida e inmunosupresión crónica.<sup>11</sup>

Por definición, las Guías Prácticas del NCCN no pueden incorporar todas las posibles variaciones clínicas y su intención no es reemplazar el buen juicio clínico o individualización de tratamientos. "Muchas excepciones a la regla" se discutieron entre los miembros del panel para cáncer de cuello uterino durante el proceso de desarrollo de estas recomendaciones.

## Diagnóstico y Plan de Trabajo

Estas guías del NCCN discuten el carcinoma de células escamosas, carcinoma adenoescamoso y adenocarcinoma de cervix. Los carcinomas de células escamosas son aproximadamente 80% de todos los cánceres de cuello uterino.<sup>12</sup> El carcinoma neuroendocrino, tumores de células pequeñas, carcinomas de células en vidrio esmerillado, sarcomas y otros tipos histológicos no están en la ámbito de estas recomendaciones.

Actualmente, los procedimientos de evaluación del International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) para el estadaje está limitado a la colposcopia, biopsia, conización del cervix, cistoscopía, y proctosigmoidoscopía. No se ha hecho referencia a procedimientos radiológicos y quirúrgicos de estadaje más complejos en la clasificación FIGO. Sin embargo, en los Estados Unidos, la tomografía

## Cáncer de Cuello Uterino

computarizada (TC), resonancia magnética nuclear (RMN), tomografía con emisión de positrones (PET) y evaluación quirúrgica son usualmente usados para diseñar y guiar las opciones de tratamiento.<sup>13-15</sup>

Los estadios más tempranos del carcinoma de cuello uterino pueden ser asintomáticos o estar asociados con una descarga vaginal acuosa o sangrado post-coital o marchas intermitentes, estos síntomas tempranos frecuentemente no son reconocidos por el paciente. Por la accesibilidad del cervix uterino para el médico, la citología de cuello uterino o frotis de Papanicolaou (Pap) y biopsias de cuello uterino pueden usualmente resultar en un diagnóstico adecuado ([vea Guías del NCCN Para la Evaluación del Cáncer de Cuello Uterino](#)). La biopsia de cono se recomienda si la biopsia de cuello uterino es inadequada para definir la invasión o si se requiere la evaluación adecuada de enfermedad microinvasiva. Sin embargo, los métodos de evaluación citológica de cuello uterino son menos útiles para diagnosticar adenocarcinoma, porque el adenocarcinoma *in situ* afecta el área del cervix que es más difícil de tomar muestras (ej., canal endocervical).<sup>3,16</sup>

El plan de trabajo para estos pacientes incluye historia y examen físico, conteo sanguíneo completo, plaquetas, y pruebas de función hepática y renal. Las imágenes radiológicas incluyen rayos x de tórax, TC, RMN o PET/TC; sin embargo, las imágenes son opcionales para pacientes con estadio IB1 o tumores pequeños. El examen por citoscopia y proctoscopía bajo anestesia deben reservarse para pacientes en quienes hay sospecha clínica de invasión en la vejiga o rectal (estadio IB2 ó mayor).<sup>17</sup>

Los miembros del panel discutieron si la laparoscopía debería incluirse como parte de estas guías del NCCN tanto en estadiaje como en tratamiento. Estas técnicas están siendo usadas más frecuentemente, pero la información de las respuestas a largo plazo aún no están disponibles. Los estadios laparoscópicos, linfadenectomías e histerectomías radicales pueden realizarse satisfactoriamente y se usan como rutina en pacientes seleccionados en varias instituciones miembros.<sup>17-19</sup> La información de los estudios en ultramar sugieren que las tasas de recurrencia son bajas para la histerectomía radical.


laparoscópica después de 3-6 años de seguimiento.<sup>20,21</sup> La histerectomía radical robótica (que es otra técnica quirúrgica minimamente invasiva) se está realizando actualmente en pacientes con cáncer de cuello uterino temprano. Los beneficios potenciales asociados con los alcances laparoscópicos y robóticos son la disminución típica de la estadiaje en el hospital y la recuperación más rápida del paciente.<sup>22,23</sup>

### Estadiaje

Por la naturaleza controversial de las imágenes radiográficas no invasivas, el sistema FIGO limita las imágenes de la radiografía de tórax, pieografía endovenosa (IVP) y enema de bario. El estadiaje del carcinoma de cervix mantiene en gran medida una evaluación clínica. Aunque la evaluación quirúrgica es más precisa que la estadificación clínica, la evaluación quirúrgica usualmente no pueden usarse en los países de bajos recursos.<sup>14,24,25</sup> El panel de recomendaciones usualmente usa las definiciones y el sistema de estadificación de FIGO de 1994 ([vea Tabla 1](#)).<sup>26</sup> Un nuevo sistema de estadificación de FIGO podría aprobarse en otoño del 2009.<sup>24,27</sup>

Históricamente, FIGO ha realizado numerosos cambios en la definición, sobre todo en el área del carcinoma microinvasivo de cervix. Actualmente, la definición de FIGO del estadio IA se limita al cáncer invasor que solamente se puede identificar microscópicamente en la patología. El cáncer de estadio IA1 incluye el cáncer invasor con una invasión medida del estroma de hasta 3.0 mm de profundidad. El estadio IA2 incluye la invasión del estroma mayor a 3.0 mm pero no más de 5.0 mm de profundidad. Para los estadios IA1 e IA2, la extensión horizontal es menor a 7.0 mm.

Es importante notar que el compromiso vascular linfático del espacio (LVS) no altera la clasificación de FIGO. FIGO no incluyó el compromiso vascular del espacio, porque los patólogos no siempre están de acuerdo respecto a si LVS está presente en las muestras de tejido. Algunos miembros del grupo de expertos creen que la presencia del LVS debería excluir la lesión del esquema de tratamiento para el estadio IA1 y que estos pacientes deben ser tratados usando las recomendaciones del estadio IB1.



El uso de exploraciones RMN, TC o PET puede ayudar en el planeamiento de tratamiento pero no se acepta para propósitos de estadios formalizados.<sup>14,25</sup> Además, FIGO ha mantenido siempre que el estadiaje está pensado sólo para propósitos de comparación y no como guía para la terapia. Como resultado, el panel usa las definiciones de FIGO como sistema de estatificación para estas recomendaciones, aunque los resultados en los estudios de proyección de imágenes (tales como TC y RMN) se usan para diseñar y dirigir opciones del tratamiento.

## Tratamiento Primario

Después de cuidadosa evaluación clínica y estatificación, el tratamiento primario del cáncer de cuello uterino de estadio temprano es la cirugía o la radioterapia (RT). Un estudio italiano randomizado comparó RT sola versus hysterectomía radical y disección de ganglios linfáticos.<sup>28</sup> Este estudio usó RT coadyuvante después de la cirugía para las mujeres con evaluación quirúrgica pT2b (que corresponde al estadio IIIB de FIGO) o una enfermedad más extensa, menos de 3 mm de estroma de cuello uterino no comprometido y ganglios cortados o positivos. Se observaron resultados idénticos para las pacientes tratadas con radiación versus cirugía, con (o sin) radiación post-quirúrgica, pero tasas de complicación más altas fueron observadas para el acercamiento de modalidad combinada. Este estudio ha sido criticado por los cirujanos por su amplio uso del RT post-quirúrgico en el brazo de la cirugía y la alta tasa de complicaciones.

El esquema del tratamiento se estratifica usando el sistema de estadios de FIGO (vea **Tabla 1**). La cirugía se reserva típicamente para la enfermedad de estadios bajos y lesiones más pequeñas, tales como estadios IA y IB1.

El panel del NCCN está de acuerdo con que la RT y la quimioterapia concurrente basada en Cisplatino (sólo Cisplatino o Cisplatino/5-Fluorouracilo [5-FU]) son el tratamiento de elección para la enfermedad con estadios IIB, IIIA, IIIB y IVA basado en los resultados de 5 ensayos clínicos randomizados (vea **Tabla 2**). El seguimiento de largo plazo de 3 de estos ensayos ha confirmado que la quimioradiación concurrente basada en Cisplatino mejora la sobrevida

libre progresión y global en comparación con RT con o sin hidroxíurea.<sup>29-31</sup> Un meta-análisis reciente reportó que la quimioradioterapia lleva a una mejoría del 6% en la sobrevida de cinco años (razón de riesgo [HR] = 0.81,  $P < .001$ ).<sup>32</sup> Aunque se tolera la quimioradiación, se han reportado efectos secundarios agudos y de largo plazo.<sup>32-34</sup> Algunos oncólogos sienten que la quimioradiación concurrente de un solo agente con Cisplatino se prefiere a Cisplatino más quimioradiación con 5-FU, porque este último puede ser más tóxico.<sup>35</sup> Los regímenes de Carboplatino concurrente a quimioradiación sin Platino son opciones para las pacientes que no pueden tolerar la quimioradiación que contiene Cisplatino.<sup>32,36-40</sup>


Recientemente, un estudio con patrón de cuidado basado en una población grande en Canadá ( $n = 4,069$ ) confirmó que la quimioradioterapia mejoró los resultados en comparación con sólo la radioterapia.<sup>41</sup> Las recomendaciones (Proyecto Standards, Options, and Recommendations [SOR] del The French National Federation of Cancer Centres [FNCLCC]) también indican que la quimioradioterapia debería ser el estándar para mujeres con cáncer de cuello uterino.<sup>42</sup> Observe que cuando se usa la quimioradiación concurrente, la quimioterapia se da tipicamente cuando se administra la radiación pélvica de haz externo.<sup>35</sup>

La histerectomía extrafascial es comúnmente recomendada para pacientes con enfermedad clínica en estadio IA1; otra opción es histerectomía radical modificada con disección de ganglios linfáticos pélvicos si la invasión linfovascular está presente (categoría 2B). Sin embargo, si la paciente es médicalemente inoperable o si se desea fertilidad, las pacientes con márgenes negativos de biopsia de cono podrían ser sometidos a observación.<sup>43</sup> Los tumores de estadio IA2 pueden tratarse con histerectomía radical y disección de ganglios linfáticos pélvicos con (o sin) muestreo de ganglios linfáticos para-aórticos. La información reciente ha sugerido que la biopsia del ganglio linfático centinela puede ser útil para disminuir la necesidad de linfadenectomía pélvica en pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio temprano, pero los miembros del grupo de expertos creen que la técnica todavía no es suficientemente precisa.<sup>44,45</sup> Sin embargo, ésta es un área interesante para mayor investigación.<sup>46-48</sup> La

hidroxíurea.<sup>29-31</sup> Un meta-análisis reciente reportó que la quimioradioterapia lleva a una mejoría del 6% en la sobrevida de cinco años (razón de riesgo [HR] = 0.81,  $P < .001$ ).<sup>32</sup> Aunque se tolera la quimioradiación, se han reportado efectos secundarios agudos y de largo plazo.<sup>32-34</sup> Algunos oncólogos sienten que la quimioradiación concurrente de un solo agente con Cisplatino se prefiere a Cisplatino más quimioradiación con 5-FU, porque este último puede ser más tóxico.<sup>35</sup> Los regímenes de Carboplatino concurrente a quimioradiación sin Platino son opciones para las pacientes que no pueden tolerar la quimioradiación que contiene Cisplatino.<sup>32,36-40</sup>

Recientemente, un estudio con patrón de cuidado basado en una población grande en Canadá ( $n = 4,069$ ) confirmó que la quimioradioterapia mejoró los resultados en comparación con sólo la radioterapia.<sup>41</sup> Las recomendaciones (Proyecto Standards, Options, and Recommendations [SOR] del The French National Federation of Cancer Centres [FNCLCC]) también indican que la quimioradioterapia debería ser el estándar para mujeres con cáncer de cuello uterino.<sup>42</sup> Observe que cuando se usa la quimioradiación concurrente, la quimioterapia se da tipicamente cuando se administra la radiación pélvica de haz externo.<sup>35</sup>

La histerectomía extrafascial es comúnmente recomendada para pacientes con enfermedad clínica en estadio IA1; otra opción es histerectomía radical modificada con disección de ganglios linfáticos pélvicos si la invasión linfovascular está presente (categoría 2B). Sin embargo, si la paciente es médicalemente inoperable o si se desea fertilidad, las pacientes con márgenes negativos de biopsia de cono podrían ser sometidos a observación.<sup>43</sup> Los tumores de estadio IA2 pueden tratarse con histerectomía radical y disección de ganglios linfáticos pélvicos con (o sin) muestreo de ganglios linfáticos para-aórticos. La información reciente ha sugerido que la biopsia del ganglio linfático centinela puede ser útil para disminuir la necesidad de linfadenectomía pélvica en pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio temprano, pero los miembros del grupo de expertos creen que la técnica todavía no es suficientemente precisa.<sup>44,45</sup> Sin embargo, ésta es un área interesante para mayor investigación.<sup>46-48</sup> La



## Cáncer de Cuello Uterino

braquiterapia con radiación pélvica (dosis al punto A: 75-80 Gy) es otra opción de tratamiento. Estas dosis se recomiendan para la mayoría de pacientes basado en la adición de fraccionamiento de haz externo y los equivalentes de braquiterapia de dosis con baja tasa convencionales (40-70 cGy/h). El tratamiento se debe modificar basado en la tolerancia del tejido normal o en cánculos de equivalencia biológicos al usar tasas de braquiterapia de dosis alta.

Para las pacientes que desean preservación de la fertilidad, se recomienda la traquelectomía radical y la disección de ganglios linfáticos pélvicos (con o sin muestreo de ganglios linfáticos para-aórticos) para cáncer de cuello uterino en estadio temprano (estadio IA2, IB1) (vea CERV-2).<sup>49-52</sup> Un estudio descubrió que entre las mujeres que trataban de concebir después de la traquelectomía radical para cáncer de cuello uterino en estadio temprano, la tasa de embarazo acumulativa a 5 años fue 52.8%; la tasa de recurrencia del cáncer fue baja, pero la tasa de aborto involuntario es mayor.<sup>53</sup> Para mujeres jóvenes (< 45 años) pre-menopáusicas con carcinoma de células escamosas en estadio temprano que opten por la preservación ovárica (ej., sólo histerectomía), el índice de metástasis ováricas es bajo.<sup>54,55</sup>

Las pacientes con tumores con estadio [B o II A] pueden tratarse con eficacia con histerectomía radical más disección bilateral de ganglios linfáticos pélvicos con o sin muestreo de ganglios para-aórticos<sup>28</sup> (categoria 1 para tumores de estadio [B1 o II A [4 cm o menos]; categoría 2B para tumores grandes con estadio [B2 o II A [mayor a 4 cm]). Otra opción para estas pacientes (con los tumores de estadio [B o II A]) es la radioterapia pélvica y braquiterapia combinadas (más quimioterapia concurrente que contiene Cisplatino para enfermedad grande con estadio [B2 o II A [categoría 1]) (vea CERV-2). Para las pacientes con tumores grandes de estadio clínico [B2 o II A que se tratan con radiación, la quimioterapia concurrente que contiene Cisplatino ha demostrado mejorar perceptiblemente la sobrevida de la paciente.<sup>56,57</sup> La adición de quimioradiación concurrente mejora perceptiblemente la sobrevida libre de progresión y global para pacientes de alto riesgo con enfermedad en estadio temprano (aqueellas con ganglios linfáticos positivos, extensión parametrial y/o

márgenes positivos) que son sometidas a histerectomía radical y linfadenectomía pélvica.<sup>58</sup> Para tumores grandes estadio [B2 o II A (mayores a 4 cm), el panel no estuvo de acuerdo (categoría 3) sobre la recomendación de la histerectomía adyuvante para pacientes que reciben quimioradiación primaria.<sup>58</sup> El EORTC está conduciendo actualmente un ensayo randomizado fase III (EORTC 55994) de quimioterapia neoadyuvante basada en Cisplatino seguido por cirugía comparado con RT más quimioterapia en pacientes con cáncer de cuello uterino de estadio [B o II].

Para las pacientes con tumores más avanzados que estén recibiendo quimioradiación primaria, el volumen de RT es crítico y está guiado por la evaluación del compromiso de ganglios para-aórticos y pélvicos. Los estudios de imágenes radiológicas se recomiendan para una enfermedad grande seleccionada [B2 ó mayor. Sin embargo, biopsia aspiración con aguja fina (BAAF) se recomienda para los resultados cuestionables vistos en las imágenes radiológicas. La evaluación quirúrgica (ej., disección de ganglios linfáticos extraperitoneal o laparoscópica) también son una opción (categoría 2B) para estas pacientes. Para las pacientes sin enfermedad ganglionar o con enfermedad limitada a la pelvis solamente por evaluación quirúrgica, el tratamiento consiste en RT pélvica con quimioterapia concurrente basada en Cisplatino (categoría 1) y braquiterapia.<sup>57</sup> Sin embargo, para las pacientes con ganglios linfáticos para-aórticos y pélvicos positivos, se debe considerar disección de ganglios linfáticos retroperitoneales seguida de RT de campo extendido, quimioterapia conteniendo Cisplatino y braquiterapia (vea CERV-6). Las pacientes con los ganglios linfáticos para-aórticos positivos que son positivas para metástasis a distancia son tratadas con quimioterapia sistémica (vea CERV-A) y RT individualizada.

### Tratamiento Adyuvante

El tratamiento adyuvante se indica después de la histerectomía radical dependiendo de los resultados de la evaluación quirúrgica y del estadio de la enfermedad. Para los tumores de pequeño volumen (4 cm o menos) en estadio [A2, IB1 o II A con ganglios linfáticos negativos después de la cirugía, las opciones incluyen 1) observación cercana o 2) radiación pélvica para factores de alto riesgo (categoría 1) (tumor

## Cáncer de Cuello Uterino

primario grande, invasión estromal profunda y/o LVSI) con (o sin) quimioterapia concurrente basada en Cisplatino (categoría 2B para quimioterapia),<sup>58-61</sup> RT pélvica adyuvante sola versus ninguna otra terapia se probó en un ensayo randomizado (Gynecologic Oncology Group [GOG] 92) de pacientes seleccionadas con carcinoma de cervix de estadio IB después de histerectomía y linfadenectomía pélvica.<sup>62</sup> Las pacientes fueron elegidas para este ensayo después de menos 2 de los factores de riesgo siguientes: (1) invasión estromal mayor a un tercio; (2) compromiso del espacio de los capilares linfáticos; o (3) diámetros de tumor de cuello uterino de más de 4 cm. Se excluyeron a las pacientes con ganglios linfáticos positivos o márgenes quirúrgicos comprometidos. Una disminución estadísticamente significativa de recurrencia se encontró en el brazo con RT comparado con el brazo “sin ningún tratamiento adicional” (15% versus 28%). El análisis de la tabla de vida indicó una reducción estadísticamente significativa (47%) en el riesgo de recurrencia (riesgo relativo = 0.53;  $P = .008$ ) en el grupo con RT. A 2 años, las tasas libres de recurrencia fueron de 88% para el grupo con RT versus 79% para el grupo sin ningún tratamiento adicional. Después de un seguimiento extenso, las diferencias de la sobrevida no alcanzaron significancia estadística ( $P = .07$ ).<sup>63</sup>

Las pacientes con ganglios pélvicos positivos, margen quirúrgico positivo o parametrio positivo deberían tratarse con radiación pélvica post-quirúrgica con quimioterapia concurrente que contenga Cisplatino (categoría 1)<sup>58</sup> con (o sin) braquiterapia vaginal (vea **CERV-3**). Según lo observado previamente, el Ensayo Intergrupo 0107 demostró un beneficio estadísticamente significativo de la radiación pélvica adyuvante con 5-FU y Cisplatino en el tratamiento de pacientes con enfermedad con estadio IA2, IB o II A que tuvieron ganglios linfáticos positivos, márgenes positivos o compromiso microscópica parametrial encontrado en la cirugía.<sup>58</sup>

Las pacientes con ganglios pélvicos positivos, margen quirúrgico positivo o parametrio positivo deberían tratarse con radiación pélvica post-quirúrgica con quimioterapia concurrente que contenga Cisplatino (categoría 1)<sup>58</sup> con (o sin) braquiterapia vaginal (vea **CERV-3**). Según lo observado previamente, el Ensayo Intergrupo 0107 demostró un beneficio estadísticamente significativo de la radiación pélvica adyuvante con 5-FU y Cisplatino en el tratamiento de pacientes con enfermedad con estadio IA2, IB o II A que tuvieron ganglios linfáticos positivos, márgenes positivos o compromiso microscópica parametrial encontrado en la cirugía.<sup>58</sup>

Si los ganglios linfáticos para-aórticos son positivos durante la evaluación quirúrgica, las pacientes deben experimentar evaluación futura con TC de tórax o exploración con PET. En mujeres que son positivas para metástasis a distancia, la biopsia de áreas sospechosas encontrada en la cirugía.<sup>58</sup>


se debe considerar como indicada (vea **CERV-3**). Si todos los hallazgos son negativos, las pacientes deberían tratar con RT a los ganglios linfáticos para-aórticos, quimioterapia concurrente basada en Cisplatino y RT pélvica (con o sin) braquiterapia. Sin embargo, las pacientes con resultados positivos deberían tratarse con quimioterapia sistémica (vea **CERV-A**) y radioterapia individualizada.

### Vigilancia

Debido a que no existe ningún estudio definitivo o acuerdo uniforme en el mejor método para la vigilancia post-tratamiento del cáncer de cuello uterino, el panel combinó los patrones de práctica de las instituciones miembro y publicó recomendaciones en consenso. El seguimiento de pacientes incluye historia y examen físico en intervalos, con citología de cuello uterino/vaginal cada 3-6 meses por 2 años, cada 6 meses por otros 3-5 años y luego anualmente. Algunos clínicos han sugerido que el seguimiento riguroso por citología no está garantizada debido a los estudios que indican que los frotis Pap no detectaron recurrencias en pacientes con cáncer de cuello uterino estadios I-II que no tuvieron síntomas después del tratamiento.<sup>64,65</sup> Es importante acentuar la buena evaluación clínica y un alto índice de sospecha, ya que el índice de detección de cáncer de cuello uterino recurrente que usa citología de cuello uterino y vaginal es bajo.<sup>66</sup>

Las radiografías de tórax anuales son optionales.<sup>66,67</sup> Muchas otras pruebas siguen siendo opcionales basadas en indicaciones clínicas, tales como conteos completos de sangre semestrales, nitrógeno de urea en la sangre y determinaciones de creatinina sérica. Las pacientes con enfermedad persistente o recurrente necesitan evaluarse usando estudios de proyección de imágenes (tales como exploración TC/PET pélvica/abdominal/de tórax) y exploración quirúrgica en casos seleccionados seguidos por terapia de rescate (es decir, terapia para la recurrencia).<sup>68</sup>

Los dilatadores vaginales se recomiendan después de la RT, ya que las pacientes que reciben RT están propensas a estenosis vaginal que puede deteriorar la función sexual. Las mujeres pueden usar dilatadores vaginales para prevenir o tratar la estenosis vaginal. El uso del dilatador puede comenzar 2-4 semanas después de que se termina la RT y puede



## Guías de Práctica en Oncología – v.1.2010

realizarse indefinidamente ([http://www.ukons.org/storage/dilators\\_guidelines.pdf](http://www.ukons.org/storage/dilators_guidelines.pdf)).

### Terapia para Recurrencia

#### Terapia Local/Regional

Las pacientes con una recurrencia localizada de cáncer de cuello uterino después de cirugía deben evaluarse para radioterapia. Los índices de rescate de aproximadamente 40% se han reportado en tales situaciones.<sup>68</sup> Para las pacientes que experimentan recurrencias locales/regionales sin RT previa o que experimentan recurrencias fuera del campo previamente tratado, la terapia para la recurrencia incluye RT dirigida al tumor y quimioterapia basada platino con (o sin) braquiterapia; la resección quirúrgica puede ser considerada si es factible. Las pacientes con enfermedad pélvica recurrente central después de RT se deberían evaluar para exenteración pélvica, con (o sin) RT intraquirúrgica (IORT).<sup>70-76</sup> En pacientes cuidadosamente seleccionadas con pequeñas lesiones (menos a 2 cm), las opciones incluyen histerectomía radical o braquiterapia. La mortalidad quirúrgica es generalmente 5% o menor, con tasas de sobrevida entre 20% y 60%. Las medidas concomitantes con tales procedimientos radicales incluyen programas de rehabilitación adecuados que se ocupan de consecuencias psicosociales y psicosexuales de la cirugía así como los procedimientos reconstructivos.<sup>71,77-79</sup> Las mujeres con recurrencia después de la exenteración pélvica deberían tratarse con quimioterapia basada en Platino, el mejor cuidado de soporte o reclutadas en un ensayo clínico. Aquellas con enfermedad no central se deberían tratar con exenteración pélvica o resección con IORT para los márgenes cercanos o positivos, RT dirigida al tumor con (o sin) quimioterapia, quimioterapia basada en Platino, el mejor cuidado de soporte o participación en un ensayo clínico.



#### Terapia Sistémica y Paliación

Las pacientes con metástasis a distancia que tienen recurrencia(s) en múltiples sitios o con recurrencia(s) no resecable(s) deberían ser tratados con quimioterapia (vea **CERV-A**) o el mejor cuidado de soporte. Para las pacientes con recurrencia(s) resecable(s), las opciones incluyen 1) considerar la resección quirúrgica con (o sin)

IORT, 2) RT con quimioterapia concurrente o 3) quimioterapia (vea **CERV-10**).

La paliación de recurrencias pélvicas en los sitios fuertemente irradiados que no son favorables a las técnicas de control del dolor local o a la resección quirúrgica es una tema clínico sin resolver. Tales sitios no son generalmente sensibles a la quimioterapia. Es un desafío clínico el paliar adecuadamente las complicaciones del dolor y las fistulas de tales recurrencias. De vez en cuando, las pacientes pueden beneficiarse de la radioterapia a una(s) recurrencia(s) localizada(s). Generalmente, estas áreas serían metástasis supraclaviculares, óseas o recurrencias ganglionares para-abdominales dolorosas. Claramente, las pacientes que responden a la quimioterapia pueden alcanzar alivio de dolor de una naturaleza transitoria.

La quimioterapia tiene un rol limitado en prolongar la sobrevida o en la mejora de calidad de vida y se recomienda para pacientes con metástasis extrapélvicas o enfermedad recurrente que no son candidatas a la RT o a cirugía exenterativa. El Cisplatino generalmente se mira como el agente más activo y se recomienda como posible quimioterapia de primera línea de agente único en cáncer de cuello uterino recurrente o metastásico; las tasas de respuesta reportadas son aproximadamente de 20% a 30%, con una respuesta completa ocasional.<sup>80-82</sup> La sobrevida general con Cisplatino es de cerca de 6-9 meses. Sin embargo, se prefieren los regímenes de combinación (vea el párrafo siguiente) (y son terapia de primera línea) si Cisplatino se usó previamente como un radiosensibilizador. El Carboplatino o Paclitaxel también se han reportado por ser tolerables y eficaces y son posibles agentes quimioterapéuticos únicos de primera línea.<sup>83-86</sup> Por lo tanto, la paliación con agente únicos Cisplatino, Carboplatino o Paclitaxel es una práctica razonable en pacientes con enfermedad recurrente no favorable a las opciones quirúrgicas o de radioterapia. Las respuestas completas también fueron observadas con Topotecan y Paclitaxel; sin embargo, Topotecan se asocia a más toxicidad que Carboplatino o Paclitaxel. Otros agentes (categoría 2B) que reportan una respuesta parcial y útil como terapia de segunda línea incluyen Bevacizumab,<sup>87</sup> Docetaxel,<sup>88</sup> Epirubicina,<sup>89,90</sup> 5-FU,<sup>91</sup> Gemcitabina,<sup>92</sup> Ifosfamida,<sup>93,94</sup> Irinotecan,<sup>95</sup> Doxorubicina liposomal,<sup>96</sup> Mitomicina,<sup>97</sup> Pemetrexed,<sup>98</sup>



## Guías de Práctica en Oncología – v.1.2010

Topotecan,<sup>99,100</sup> y Vinorelbina.<sup>101</sup>

Los regímenes de quimioterapia de combinación basados en Cisplatino tales como Cisplatino/Paclitaxel y Cisplatino/Topotecan se han investigado extensamente en estudios clínicos.<sup>102-105</sup> Un estudio randomizado fase III en 264 pacientes elegibles que comparó Paclitaxel y Cisplatino versus Cisplatino solo demostró que la combinación de 2 fármacos tuvo una tasa de respuesta más alta (36% versus 19%) y mejor sobrevida libre de progresión (4.8 versus 2.8 meses;  $P > .001$ ), aunque no se considera ninguna mejora en sobrevida.<sup>102</sup> Otro estudio randomizado fase III de GOG investigó la combinación de Cisplatino y Topotecan versus Cisplatino solo en cáncer de cuello uterino recurrente o persistente. En este estudio de 294 pacientes elegibles, el régimen de combinación con Topotecan demostró ser superior a Cisplatino como agente único con respecto a la tasa de respuesta total (27% versus 13%;  $P = .004$ ), sobrevida libre de progresión (4.6 versus 2.9 meses;  $P = .014$ ) y mediana de sobrevida (9.4 versus 6.5 meses,  $P = .017$ ).<sup>103</sup> Un estudio fase II evaluó Cisplatino y Gemcitabina (categoría 2B) en pacientes con cáncer de cuello uterino avanzado, recurrente o persistente; se evaluaron 17 pacientes.<sup>106</sup> La tasa de respuesta fue 57% en las pacientes que no habían recibido RT previamente; hubo una respuesta completa de 14 meses.

Paclitaxel y Carboplatino se han evaluado para cáncer de cervix recurrente o persistente; 4 de 15 pacientes tuvieron respuesta completa y 5 tuvieron respuesta parcial para una tasa de respuesta total de 60%. La mediana de sobrevida de los 15 pacientes tratados fue 17 meses (rango, 4 a 39 meses).<sup>107</sup> En otro estudio que usó Paclitaxel y Carboplatino en 25 mujeres, mediana de sobrevida global fue 21 meses.<sup>108</sup> Recientemente, un estudio que usó Paclitaxel y Carboplatino en 51 mujeres tuvo una mediana de sobrevida global de 13 meses.<sup>109</sup> Un ensayo retrospectivo reciente que evaluó Cisplatino/Paclitaxel versus Carboplatino/Paclitaxel concluyó que el último régimen fue más fácil de administrar y era menos tóxico.<sup>110</sup>

La combinación de Vinorelbina y Cisplatino también se ha evaluado en 42 pacientes con cáncer de cuello uterino recurrente o metastásico;

la tasa de respuesta total fue 48%.<sup>111</sup> GOG ha terminado un ensayo fase III (GOG 204) que evaluó 4 regímenes de Cisplatino doble en pacientes con cáncer metastásico avanzado o recurrente (Cisplatino/Paclitaxel, Cisplatino/Topotecan, Cisplatino/Gemcitabina versus Cisplatino/Vinorelbina) en 513 pacientes.<sup>112</sup> No se vio diferencias en la sobrevida global o toxicidades; sin embargo, las tendencias para la tasa de respuesta, sobrevida libre de progresión y sobrevida total (12.9 versus 10 meses) sugieren que Cisplatino/Paclitaxel es superior a los otros regímenes. La información sugiere que Cisplatino/Paclitaxel es el mejor régimen para el cáncer de cuello uterino avanzado metastásico o recurrente (categoría 1).

Las terapias con vacunas no tienen un rol establecido en el presente, a excepción de un ensayo clínico.<sup>113,114</sup> La terapia dirigida (usando moléculas pequeñas o anticuerpos monoclonales) está actualmente evaluándose.<sup>87,115-117</sup> Por lo tanto, las pacientes con cáncer sistémico refractario justifican tener un acercamiento coordinado comprensivo, comprometiendo cuidado hospitalario, consultores para el dolor, y apoyo emocional y espiritual, adecuados a cada situación individual.

## Cáncer de Cuello Uterino Incidental

Un escenario clínico que requiere manejo oncológico es el hallazgo de carcinoma de cuello uterino invasivo después de la histerectomía simple. El plan de trabajo para estos pacientes incluye historia y examen físico, conteo de sangre completo, plaquetas, y pruebas de función hepática y renal. Las imágenes radiológicas incluyen radiografía de tórax, TC, RMN o PET, aunque estas pruebas son opcionales para pacientes con tumores con estadio IB1 ó menor. Los exámenes de citoscopia y proctoscopia bajo anestesia deberían reservarse para pacientes en quienes hay sospecha clínica de cáncer en velilla o recto (estadio IB2 ó mayor).

No hay información definitiva respecto al tratamiento de seguimiento apropiado de estos pacientes. El panel cree que un esquema de tratamiento razonable para pacientes con tumores con estadio IA1 con LVSI o con estadio IA2 ó mayor (hallazgos patológicos) debería basarse en el estadio de los márgenes quirúrgicos. Si los márgenes

## Cáncer de Cuello Uterino

son positivos y las imágenes son negativas para enfermedad ganglionar, entonces debería recomendarse quimioradiación concurrente con o sin braquiterapia individualizada (vea **CERV-7**).

Si los márgenes o imágenes son negativas en tumores en estadio IA2 o mayor, las opciones incluyen (1) RT pélvica y braquiterapia con (o sin) quimioterapia con Cisplatino; o (2) una parametrectomía completa, vaginectomía superior y disección de ganglios linfáticos pélvicos con (o sin) muestreo de ganglios linfáticos abórticos. Las pacientes con ganglios linfáticos negativos deben observarse o tratarse con radiación pélvica opcional con (o sin) braquiterapia vaginal si tienen factores de alto riesgo (ej., tumor primario grande, invasión estromal profunda y/o LVSI). La quimioradiación concurrente basado en Cisplatino se recomienda en enfermedad residual macroscópica, imágenes positivas, enfermedad en ganglios linfáticos o paramétrico, o un margen quirúrgico positivo; la braquiterapia individualizada se indica claramente para un margen vaginal positivo. Las pacientes con estadio IA1 sin LVSI deben ser sometidas a vigilancia (vea **CERV-8**).

### Radioterapia

El algoritmo del NCCN da recomendaciones de RT para las dosis. Estas dosis de RT deben interpretarse como recomendaciones independientes, porque las técnicas RT y el juicio clínico son una parte esencial para desarrollar un régimen de tratamiento apropiado.

Las dosis de haz externo representan el rango de dosis empleando regímenes de tratamiento fraccionados convencionalmente (45-50 Gy a CTv). Las dosis de braquiterapia usadas son para aplicaciones de tasas de dosis baja (40 a 70 cGy/h), con dosis al punto A aumentadas a las dosis de haz externo para permitir que se compare los tratamientos. Estas dosis pueden modificarse para pacientes individuales para dar cobertura adecuada del tumor y tomar en cuenta las tolerancias del tejido normal.

Las técnicas de RT de haz externo y braquiterapia han mejorado, así como un mejor entendimiento de la influencia del tiempo total de tratamiento en la respuesta.<sup>118-120</sup> Los estadios óptimos de pacientes para delinejar precisamente el volumen del tumor primario y drenarle




los ganglios linfáticos, incluyendo estudios radiológicos abdominopélvicos (exploraciones TC, RMN o PET), se recomiendan en pacientes con tumores grandes o con estadio avanzado.

### Planeamiento de Campos de Tratamiento

El uso del planeamiento de tratamiento de tridimensional para los campos del RT de haz externo y las colocaciones de braquiterapia pueden ayudar en la configuración personalizada de las distribuciones de dosis para asegurar la adecuada cobertura del tumor en todas las dimensiones y minimizar al mínimo la exposición del tejido normal. Los márgenes de campo anteriores deben incluir, donde se indique, las posibles extensiones del tumor en el cuerpo del útero. Los márgenes de campo posteriores deberían incluir la extensión del tumor en el ligamento uterosacro y los ganglios linfáticos presacros. Los márgenes de campo laterales necesitan incluir adecuadamente los ganglios linfáticos pélvicos. La radioterapia modulada en función de la intensidad (IMRT) está llegando a utilizarse más ampliamente; sin embargo, sigue habiendo temas con respecto a la definición del blanco, immobilización y reproducibilidad que sigue por validarse.<sup>121-125</sup>

Necesitan tratarse los ganglios linfáticos inguinales por lesiones en el tercio más bajo de la vagina. El uso de radiación de campo extendido para tratar la enfermedad de ganglios linfáticos para-aórticos oculta o macroscópica necesita planearse cuidadosamente para asegurar la dosis adecuada (45 Gy para enfermedad microscópica) sin exceder las tolerancias del intestino, médula espinal o renal. Las técnicas de braquiterapia intracavitarias o intersticiales han demostrado ser unos componentes vitales en el tratamiento de tumores de cuello uterino invasivos. Esto es particularmente cierto en etapas más avanzadas de la enfermedad.

La radioterapia inicial de 40 Gy a toda la pelvis es a menudo necesaria para obtener la contracción del tumor para permitir colocaciones intracavitarias óptimas. Con los sistemas intracavitarios de tasas de dosis bajas, las dosis totales de la braquiterapia y radiación de haz externo al punto A de al menos 80 Gy se recomiendan actualmente para tumores pequeños, con dosis de al menos 85 Gy recomendados para tumores más avanzados.



para tumores más grandes.

### Minimizando Daño de Tejido

Se deben hacer ajustes para reducir al mínimo la dosis de radiación a los tejidos circundantes normales (ej., vejiga, recto y colon sigma). Los campos de refuerzo en forma de cono invertido se debería usar con los ganglios linfáticos pélvicos y áreas de extensión parametrial comprometidas. Estas regiones se deberían tratar con dosis totales de 60 a 65 Gy. Las técnicas centrales de bloqueo individualizadas se deben usar para proteger de las colocaciones intracavitarias a esas porciones del intestino delgado, recto y vejiga que hayan sido incluidas en las regiones de dosis altas. Recomendaciones similares se aplican a los sistemas intracavitarios de tasas de dosis alta, para los cuales se ha usado un amplio rango de regímenes de tratamiento (generalmente usando entre 3 y 6 fracciones, con dosis generalmente entre 5 y 10 Gy por fracción). Las modificaciones de dosis pueden necesitarse para pacientes que serán sometidos a histerectomía o para el tratamiento postquirúrgico.

Varios, pero no todos, los análisis retrospectivos han sugerido un efecto nocivo de la duración prolongada del tratamiento en la respuesta. Extender el tratamiento total más allá de 6 a 8 semanas puede dar lugar aproximadamente a una disminución del 0.5% al 1% del control pélvico y sobrevida de causa específica para cada día adicional del tiempo total de tratamiento. Así, el curso entero de la RT debería terminarse a su debido tiempo (ej., menos de 8 semanas); los retrasos o cortes en la radioterapia deben evitarse siempre que sea posible, aunque no se haya hecho ningún ensayo randomizado prospectivo.

### Quimioradiación Concurrente

Cinco ensayos fase III randomizados han demostrado un beneficio estadístico significativo de la quimioradiación concurrente basada en Cisplatino para los cánceres de cuello uterino avanzados (vea Tabla 2 y abajo).<sup>56-58,126-128</sup> Estos 5 ensayos han demostrado que el uso concurrente de quimioradiación resulta en una disminución de 30% a 50% de riesgo de muerte comparado a RT sola. Aunque el régimen de quimioterapia concurrente óptimo a utilizarse con RT requiere

mayor investigación, estos 5 ensayos han establecido claramente un rol de la quimioradiación concurrente basada en Cisplatino. Un meta-análisis reciente reportó que la quimioradioterapia lleva a una mejora del 6% en la sobrevida a cinco años.<sup>32</sup>

### Regímenes Aceptados Actualmente

Para la quimioradiación concurrente, los regímenes actualmente aceptados son Cisplatino solo (semanal) o Cisplatino combinado con 5-FU en infusión cada 3 a 4 semanas. Algunos oncólogos sienten que la quimioradiación concurrente de Cisplatino como agente único se prefiere a la quimioradiación con Cisplatino más 5-FU, porque este último puede ser más tóxico.<sup>35</sup> La información sugiere que el uso de 5-FU solo (con RT) no es un régimen óptimo; sin embargo, este estudio tuvo poca fuerza.<sup>32,129</sup> Carboplatino concurrente con radiación o los regímenes sin Platino son opciones para los pacientes que no pueden tolerar la quimioradiación que contenga Cisplatino.<sup>32,36-40</sup> El panel del NCCN creé que usar "consolidación sistémica" (ej., agregando quimioterapia después de la quimioradiación) se debería utilizar solamente en ensayos clínicos (ej., RTOG 0724).<sup>32,116,130</sup>

### Cinco Ensayos Fase III Randomizados

Peters y colegas en el Ensayo INT-0107 (SWOG-8797) evaluaron RT pélvica post-quirúrgica con (o sin) 5-FU y Cisplatino para el tratamiento del cáncer de cuello uterino estadios IA2, de IB y II A con ganglios linfáticos positivos, márgenes positivos o compromiso parametrial microscópico a la hora de la cirugía.<sup>58</sup> La sobrevida libre de progresión de 4 años mejoró significativamente con el uso de radiación más quimioterapia, comparado con RT solo (81% versus 63%, respectivamente;  $P = .01$ ). El riesgo relativo de muerte fue reducido en 50% para el grupo que recibió 5-FU coadyuvante y Cisplatino conjuntamente con la radiación. Una actualización parcial de este ensayo sugirió que la quimioradiación es menos beneficiosa en pacientes con riesgo bajo de recurrencia (es decir, aquellos con pequeños tumores [ $< 2$  cm] o solamente un ganglio positivo).<sup>59</sup>

Keys y sus colegas (ensayo GOG 123) estudiaron el uso de Cisplatino como un adjunto a la RT en pacientes que fueron sometidos

## Cáncer de Cuello Uterino

posteriormente a hysterectomías extrafasciales. El estudio incluyó pacientes con tumores grandes estadio IB de 4 cm o mayor en diámetro o con forma de baril en la configuración. Las tasas de sobrevida a 3 años fueron 83% para el grupo de radiación más Cisplatino más hysterectomía comparado con 74% para el grupo de radiación más hysterectomía. La adición de Cisplatino dio lugar a un riesgo relativo de muerte del 0.54.<sup>56</sup> El seguimiento a largo plazo (101 meses) confirmó estos resultados.<sup>31</sup> Rose y colegas (ensayo GOG 120) investigaron el uso de la radiación pélvica estándar con 1 de 3 regímenes concurrentes de quimioterapia—sólo hidroxíurea, sólo Cisplatino o Cisplatino más 5-FU más hidroxíurea—en pacientes con cáncer en estadio II B, III o IVA y con ganglios linfáticos para-aórticos negativos. La tasa de sobrevida a 3 años en ambos brazos de tratamiento que contenían Cisplatino fue 65%, comparado con 47% para grupo de tratamiento de radiación pélvica más hidroxíurea. El riesgo relativo de muerte fue 0.61 para la radiación pélvica más Cisplatino y 0.58 para el Cisplatino más 5-FU más hidroxíurea más radiación pélvica, comparado con las pacientes tratados con la radiación pélvica más hidroxíurea sola.<sup>128</sup> El seguimiento a largo plazo (106 meses) ha confirmado que la quimioradiación concurrente basada en Cisplatino mejora la sobrevida libre de progresión y global en comparación con hidroxíurea más RT.<sup>28</sup>


Morris y sus colegas (ensayo RTOG 9001) evaluaron la radiación pélvica más para-aórtica comparado con la radiación pélvica más 5-FU más el tratamiento con Cisplatino en pacientes con cáncer de cuello uterino estadio IIB a IVA y en pacientes con estadio IB a IIA con tumores de 5 cm o mayores o con metástasis a los ganglios linfáticos pélvicos. La tasa de sobrevida a 5 años para el brazo del tratamiento con Cisplatino fue 73%, comparado con el 58% para las pacientes tratadas con radiación pélvica más para-aórtica ( $P = .004$ ). La adición de quimioterapia dio lugar a un riesgo relativo de muerte de 0.52.<sup>57</sup> Después de 8 años, la sobrevida global siguió siendo perceptiblemente mayor para las pacientes que recibieron tratamiento concomitante con Cisplatino (67% versus 41%,  $P < .0001$ ).<sup>30</sup>

Whitney y colegas (ensayo GOG 85) también mostraron un beneficio significativo para el uso de quimioterapia basada en Cisplatino.<sup>127</sup> Las pacientes reclutadas en este estudio tuvieron cáncer de cuello uterino estadio IIB a IVA con ganglios linfáticos para-aórticos negativos evaluados quirúrgicamente. Estos pacientes se randomizaron a radiación pélvica con hidroxíurea concurrente o a radiación pélvica con Cisplatino más 5-FU. Una mejoría estadísticamente significativa en la tasa de sobrevida a 3 años se observó en el régimen que contenía Cisplatino (67% versus 57%), resultando en un riesgo relativo de muerte de 0.72.

### Vacunación Contra HPV

Gardasil es una vacuna profiláctica bivalente contra ciertos tipos de HPV (tipos 6, 11, 16, 18), que causan cáncer de cuello uterino, vulvar, y vaginal y verrugas genitales.<sup>5-9,131</sup> La vacuna Gardasil está actualmente aprobada para prevenir cáncer de cuello uterino, vulvar, y vaginal y verrugas genitales por HPV 6, 11, 16 y 18 en niñas y mujeres de 9 a 26 años de edad; sin embargo, es más efectivo si se administra antes que se inicie el acto sexual. Gardasil también se aprueba para prevenir las verrugas genitales en niños y hombres de 9 a 26 años de edad. Cervarix es una vacuna profiláctica bivalente de HPV contra los tipos 16 y 18.<sup>132,133</sup> Cervarix recientemente se aprobó en los Estados Unidos para prevenir el cáncer de cuello uterino y lesiones precancerosas debidas al HPV 16 y 18 en niñas y mujeres de 10 a 25 años de edad (<http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm187048.htm>). La vacuna bivalente también está aprobada en más de 90 otros países.

Las recomendaciones del American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y American Cancer Society (ACS) todas están de acuerdo con que las mujeres de 11 a 12 años de edad deberían recibir vacunación de rutina con una vacuna HPV, pero difieren respecto a las recomendaciones para otros grupos de edades.<sup>134-136</sup> Las vacunas del HPV no se recomiendan en mujeres mayores a 26 años de edad.



## Cáncer de Cuello Uterino

posteriormente a hysterectomías extrafasciales. El estudio incluyó pacientes con tumores grandes estadio IB de 4 cm o mayor en diámetro o con forma de baril en la configuración. Las tasas de sobrevida a 3 años fueron 83% para el grupo de radiación más Cisplatino más hysterectomy comparado con 74% para el grupo de radiación más hysterectomy. La adición de Cisplatino dio lugar a un riesgo relativo de muerte del 0.54.<sup>56</sup> El seguimiento a largo plazo (101 meses) confirmó estos resultados.<sup>31</sup> Rose y colegas (ensayo GOG 120) investigaron el uso de la radiación pélvica estándar con 1 de 3 regímenes concurrentes de quimioterapia—sólo hidroxíurea, sólo Cisplatino o Cisplatino más 5-FU más hidroxíurea—en pacientes con cáncer en estadio II B, III o IV A y con ganglios linfáticos para-aórticos negativos. La tasa de sobrevida a 3 años en ambos brazos de tratamiento que contenían Cisplatino fue 65%, comparado con 47% para grupo de tratamiento de radiación pélvica más hidroxíurea. El riesgo relativo de muerte fue 0.61 para la radiación pélvica más Cisplatino y 0.58 para el Cisplatino más 5-FU más hidroxíurea más radiación pélvica, comparado con las pacientes tratados con la radiación pélvica más hidroxíurea sola.<sup>128</sup> El seguimiento a largo plazo (106 meses) ha confirmado que la quimioradiación concurrente basada en Cisplatino mejora la sobrevida libre de progresión y global en comparación con hidroxíurea más RT.<sup>28</sup>


Morris y sus colegas (ensayo RTOG 9001) evaluaron la radiación pélvica más para-aórtica comparado con la radiación pélvica más 5-FU más el tratamiento con Cisplatino en pacientes con cáncer de cuello uterino estadio I B a IV A y en pacientes con estadio IB a II A con tumores de 5 cm o mayores o con metástasis a los ganglios linfáticos pélvicos. La tasa de sobrevida a 5 años para el brazo del tratamiento con Cisplatino fue 73%, comparado con el 58% para las pacientes tratadas con radiación pélvica más para-aórtica ( $P = .004$ ). La adición de quimioterapia dio lugar a un riesgo relativo de muerte de 0.52.<sup>57</sup> Después de 8 años, la sobrevida global siguió siendo perceptiblemente mayor para las pacientes que recibieron tratamiento concomitante con Cisplatino (67% versus 41%,  $P < .0001$ ).<sup>30</sup>

Whitney y colegas (ensayo GOG 85) también mostraron un beneficio significativo para el uso de quimioterapia basada en Cisplatino.<sup>127</sup> Las pacientes reclutadas en este estudio tuvieron cáncer de cuello uterino estadio I B a IV A con ganglios linfáticos para-aórticos negativos evaluados quirúrgicamente. Estos pacientes se randomizaron a radiación pélvica con hidroxíurea concurrente o a radiación pélvica con Cisplatino más 5-FU. Una mejoría estadísticamente significativa en la tasa de sobrevida a 3 años se observó en el régimen que contenía Cisplatino (67% versus 57%), resultando en un riesgo relativo de muerte de 0.72.

### Vacunación Contra HPV

Gardasil es una vacuna profiláctica bivalente contra ciertos tipos de HPV (tipos 6, 11, 16, 18), que causan cáncer de cuello uterino, vulvar, y vaginal y verrugas genitales.<sup>5-9,131</sup> La vacuna Gardasil está actualmente aprobada para prevenir cáncer de cuello uterino, vulvar, y vaginal y verrugas genitales por HPV 6, 11, 16 y 18 en niñas y mujeres de 9 a 26 años de edad; sin embargo, es más efectivo si se administra antes que se inicie el acto sexual. Gardasil también se aprueba para prevenir las verrugas genitales en niños y hombres de 9 a 26 años de edad. Cervarix es una vacuna profiláctica bivalente de HPV contra los tipos 16 y 18.<sup>132,133</sup> Cervarix recientemente se aprobó en los Estados Unidos para prevenir el cáncer de cuello uterino y lesiones precancerosas debidas al HPV 16 y 18 en niñas y mujeres de 10 a 25 años de edad (<http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm187048.htm>). La vacuna bivalente también está aprobada en más de 90 otros países.

Las recomendaciones del American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y American Cancer Society (ACS) todas están de acuerdo con que las mujeres de 11 a 12 años de edad deberían recibir vacunación de rutina con una vacuna HPV, pero difieren respecto a las recomendaciones para otros grupos de edades.<sup>134-136</sup> Las vacunas del HPV no se recomiendan en mujeres mayores a 26 años de edad.



## Cáncer de Cuello Uterino


**Tabla 2:**  
**Estimaciones del Riesgo Relativo de Muerte en Cinco Ensayos Clínicos de Quimioterapia Concurrente y Radioterapia.**

Estudio	Estado FIGO	Grupo Control	Grupo de Comparación	Riesgo Relativo de Muerte en el Grupo de Comparación
Keys et al.*	IB2	Radioterapia	Radioterapia más Cisplatino semanal	0.54
Rose, Bundy, Watkins et al.*	IIB-IVA	Radioterapia más hidroxíurea	Radioterapia más Cisplatino semanal	0.61
Morris et al.*	IB2-IVA	Radioterapia de campo extendido	Radioterapia más Cisplatino y Fluorouracilo	0.52
Whitney et al.	IIB-IVA	Radioterapia más hidroxíurea	Radioterapia más Cisplatino y Fluorouracilo	0.72
Peters et al.	IB o IIA (seleccionado post-quirúrgicamente)	Radioterapia	Radioterapia más Cisplatino y Fluorouracilo	0.50

Abreviación: FIGO, International Federation of Gynecology and Obstetrics.

\* Estos estudios han sido actualizados (vea Discusión).

Usado con permiso de: Thomas GM. Improved treatment for cervical cancer concurrent chemotherapy and radiotherapy. N Engl J Med 1999;340(15):1198-1200. Copyright © 1999 Massachusetts Medical Society. Todos los derechos reservados.



28


## Guías de Práctica en Oncología – v.1.2010

# Cáncer de Cuello Uterino

Índice de Recomendaciones  
IDC de Cáncer de Cuello Uterino:  
Estandificación, Discusión, Referencias

### Referencias

1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics, 2009. CA Cancer J Clin. 2009;59:225-249.
2. Howe HL, Wu X, Roes LA, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, 1975-2003, featuring cancer among U.S. Hispanic/Latino populations. Cancer. 2006;107:1711-1742.
3. Sherman ME, Wang SS, Carreon J, Devesa SS. Mortality trends for cervical squamous and adenocarcinoma in the United States. Relation to incidence and survival. Cancer. 2005;103:1258-1264.
4. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics. 2002. CA Cancer J Clin. 2005;55:74-108.
5. Kamangar F, Dores GM, Anderson WF. Patterns of cancer incidence, mortality, and prevalence across five continents: defining priorities to reduce cancer disparities in different geographic regions of the world. J Clin Oncol. 2006;24:2137-2150.
6. Villa LL, Costa RL, Petta CA, et al. Prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like particle vaccine in young women: a randomised double-blind placebo-controlled multicentre phase II efficacy trial. Lancet Oncol. 2005;6:271-278.
7. Ault KA. Effect of prophylactic human papillomavirus L1 virus-like particle vaccine on risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 2, grade 3, and adenocarcinoma in situ: a combined analysis of four randomized clinical trials. Lancet. 2007;369:1861-1868.
8. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical lesions. N Engl J Med. 2007;356:1815-1927.
9. Arbyn M, Dillner J. Review of current knowledge on HPV vaccination: an appendiz to the European Guideline for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. J Clin Virol. 2007;38:189-197.
10. Rambout L, Hopkins L, Hutton B, Fergusson D. Prophylactic vaccination against human papillomavirus infection and disease in
11. Comparison of risk factors for invasive squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of the cervix: collaborative reanalysis of individual data on 8,097 women with squamous cell carcinoma and 1,374 women with adenocarcinoma from 12 epidemiological studies. Int J Cancer. 2007;120:885-891.
12. Reimers LL, Anderson WF, Rosenberg PS, Henson DE, Castle PE. Etiologic heterogeneity for cervical carcinoma by histopathologic type, using comparative age-period-cohort models. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009;18:792-800.
13. ACOG practice bulletin. Diagnosis and treatment of cervical carcinomas. Number 35, May 2002. American College of Obstetricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet. 2002;78:79-91.
14. Gold MA, Tian C, Whitney CW, Rose PG, Lanciano R. Surgical versus radiographic determination of para-aortic lymph node metastases before chemoradiation for locally advanced cervical carcinoma: a Gynecologic Oncology Group Study. Cancer. 2008;112:1954-1963.
15. Monk BJ, Tian C, Rose PG, Lanciano R. which clinical/pathologic factors matter in the era of chemoradiation as treatment for locally advanced cervical carcinoma? Analysis of two Gynecologic Oncology Group (GOG) trials. Gynecol Oncol. 2007;105:427-433.
16. Sasieni P, Castanon A, Cuzick J. Screening and adenocarcinoma of the cervix. Int J Cancer. 2009;125:525-529.
17. Ramirez PT, Slomovitz BM, Soliman PT, Coleman RL, Levenback C. Total laparoscopic radical hysterectomy and lymphadenectomy: the M. D. Anderson Cancer Center experience. Gynecol Oncol. 2006;102:252-255.
18. Abu-Rustum NR, Gemignani ML, Moore K, et al. Total laparoscopic radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy using the argon-



## Cáncer de Cuello Uterino

beam coagulator: pilot data and comparison to laparotomy. *Gynecol Oncol*. 2003;91:402-409.

19. Chi DS. Laparoscopy in gynecologic malignancies. *Oncology* (Williston Park). 1999;13:773-782; discussion 782-775 passim.

20. Chen Y, Xu H, Li Y, et al. The outcome of laparoscopic radical hysterectomy and lymphadenectomy for cervical cancer: a prospective analysis of 295 patients. *Ann Surg Oncol*. 2008;15:2847-2855.

21. Puntambekar SP, Palep RJ, Puntambekar SS, et al. Laparoscopic total radical hysterectomy by the Pune technique: our experience of 248 cases. *J minim Invasive Gynecol*. 2007;14:682-689.

22. Lowe MP, Chamberlain DH, Kamelle SA, Johnson PR, Tillmanns TD. A multi-institutional experience with robotic-assisted radical hysterectomy for early stage cervical cancer. *Gynecol Oncol*. 2009;113:191-194.

23. Nezhat FR, Datta MS, Liu C, Chuang L, Zakashansky K. Robotic radical hysterectomy versus total laparoscopic radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy for treatment of early cervical cancer. *JSLS*. 2008;12:227-237.

24. Pecorelli S, Zigliani L, Odicino F. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix. *Int J Gynaecol Obstet*. 2009;105:107-108.

25. Moore DH. Surgical staging and cervical cancer: after 30 years, have we reached a conclusion? *Cancer*. 2008;112:1874-1876.

26. Benedet JL, Bender H, Jones H, 3rd, Ngan HY, Pecorelli S. FIGO staging classifications and clinical practice guidelines in the management of gynecologic cancers- FIGO Committee on Gynecologic Oncology. *Int J Gynaecol Obstet*. 2000;70:209-262.

27. Pecorelli S. Revised FIGO staging for carcinoma of the vulva, cervix, and endometrium. *Int J Gynaecol Obstet*. 2009;105:103-104.

28. Landoni F, Maneo A, Colombo A, et al. Randomised study of radical surgery versus radiotherapy for stage Ib-IIa cervical cancer. *Lancet*. 1997;350:535-540.

29. Rose PG, Ali S, Watkins E, et al. Long-term follow-up of a randomized trial comparing concurrent single agent cisplatin, cisplatin based combination chemotherapy, or hydroxyurea during pelvic irradiation for locally advanced cervical cancer: a Gynecologic Oncology Group Study. *J Clin Oncol*. 2007;25:2804-2810.
30. Eifel PJ, Winter K, Morris M, et al. Pelvic irradiation with concurrent chemotherapy versus pelvic and para-aortic irradiation for high-risk cervical cancer: an update of radiation therapy oncology group trial (RTOG) 90-01. *J Clin Oncol*. 2004;22:872-880.
31. Stehman FB, Ali S, Keys HM, et al. Radiation therapy with or without weekly cisplatin for bulky stage 1B cervical carcinoma: follow up of a Gynecologic Oncology Group trial. *Am J Obstet Gynecol*. 2007;197:503.e501-506.
32. Reducing uncertainties about the effects of chemoradiotherapy for cervical cancer: a systematic review and meta-analysis of individual patient data from 18 randomized trials. *J Clin Oncol*. 2008;26:5802-5812.
33. King M, McConkey C, Latief TN, Hartley A, Fernando I. Improved survival after concurrent weekly cisplatin and radiotherapy of individual carcinoma with assessment of acute and late side-effects. *Clin Oncol (R Coll Radiol)*. 2006;18:38-45.
34. Tan LT, Zahra M, Long-term survival and late toxicity after chemoradiotherapy for cervical cancer-the Addenbrooke's experience. *Clin Oncol (R Coll Radiol)*. 2008;20:358-364.
35. Monk BJ, Tewari KS, Koh WJ. Multimodality therapy for locally advanced cervical carcinoma: state of the art and future directions. *J Clin Oncol*. 2007;25:2952-2965.
36. Cetica L, García-Arias A, Uribe Mde J, et al. Concurrent chemoradiation with carboplatin for elderly, diabetic and hypertensive patients with locally advanced cervical cancer. *Eur J Gynaecol Oncol*. 2008;29:608-612.



37. Dubay RA, Rose PG, O'Malley DM, Shalodi AD, Ludin A, Selim MA. Evaluation of concurrent and adjuvant carboplatin with radiation therapy for locally advanced cervical cancer. *Gynecol Oncol.* 2004;94:121-124.
38. Higgins RV, Naumann WR, Hall JB, Haake M. Concurrent carboplatin with pelvic radiation therapy in the primary treatment of cervical cancer. *Gynecol Oncol.* 2003;89:499-503.
39. Lavidhaya V, Chittapanarux I, Sangnuchi S, et al. Concurrent mitomycin C, 5-fluorouracil, and radiotherapy in the treatment of locally advanced carcinoma of the cervix: a randomized trial. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2003;55:1226-1232.
40. Wong LC, Ngan HY, Cheung AN, Cheng DK, Ng TY, Choy DT. Chemoradiation and adjuvant chemotherapy in cervical cancer. *J Clin Oncol.* 1999;17:2055-2060.
41. Pearcey R, Miao Q, Kong W, Zhang-Salomons J, Mackillop WJ. Impact of adoption of chemoradiotherapy on the outcome of cervical cancer in Ontario: results of a population-based cohort study. *J Clin Oncol.* 2007;25:2383-2388.
42. Hélie-Méder C, Fervers B, Fondriant E, Haugh M, Lhomme C, Guastalla JP. SOR guidelines for concomitant chemoradiotherapy for patients with uterine cervical cancers: evidence update bulletin 2004. *Ann Oncol.* 2005;16:1100-1108.
43. Koliopoulos G, Sotiriadis A, Kyrgiou M, Martin-Hirsch P, Makrydimas G, Paraskevaidis E. Conservative surgical methods for FIGO stage IA2 squamous cervical carcinoma and their role in preserving women's fertility. *Gynecol Oncol.* 2004;93:469-473.
44. Lecuru F, Bats A, Mathevet P, et al. Impact of sentinel lymph node biopsy on staging of early cervical cancer: Results of a prospective, multicenter study. *J Clin Oncol (Meeting Abstracts).* 2009;27:CRA5506.
45. Altgassen C, Hertel H, Brandstadt A, Kohler C, Durst M, Schneider A. Multicenter validation study of the sentinel lymph node concept in cervical cancer: AGO Study Group. *J Clin Oncol.* 2008;26:2943-2951.
46. Selman TJ, Mann C, Zamora J, Appleyard TL, Khan K. Diagnostic accuracy of tests for lymph node status in primary cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. *CMAJ.* 2008;178:855-862.
47. Van de Lande J, Torrenga B, Rajmakers PG, et al. Sentinel lymph node detection in early stage uterine cervix carcinoma: a systematic review. *Gynecol Oncol.* 2007;106:604-613.
48. Schneider A. The sentinel concept in patients with cervical cancer. *J Surg Oncol.* 2007;96:337-341.
49. Bernardini M, Barrett J, Seaward G, Covens A. Pregnancy outcomes in patients after radical trachelectomy. *Am J Obstet Gynecol.* 2003;189:1378-1382.
50. Boss EA, van Golde RJ, Beerenddonk CC, Massuger LF. Pregnancy after radical trachelectomy: a real option? *Gynecol Oncol.* 2005;99:S152-156.
51. Plante M, Renaud MC, Hoskins JA, Roy M. Vaginal radical trachelectomy: a valuable fertility-preserving option in the management of early-stage cervical cancer. A series of 50 pregnancies and review of the literature. *Gynecol Oncol.* 2005;98:3-10.
52. Marchiole P, Benchabib M, Bueno A, Lazlo E, Dargent D, Mathevet P. Oncological safety of laparoscopic-assisted vaginal radical trachelectomy (LART) or Dargent's operation): a comparative study with laparoscopic-assisted vaginal radical hysterectomy (LARvH). *Gynecol Oncol.* 2007;106:132-141.
53. Shepherd JH, Spencer C, Herod J, Ind TE. Radical vaginal trachelectomy as a fertility-sparing procedure in women with early-stage cervical cancer-cumulative pregnancy rate in a series of 123 women. *BJOG.* 2006;113:719-724.
54. Landoni F, Zanagnolo V, Lovato-Diaz L, et al. Ovarian metastases in early-stage cervical cancer (IA2-IIA), a multicenter retrospective study of 1965 patients (a Cooperative Task Force study). *Int J Gynecol Cancer.* 2007;17:623-628.



DR. MANUEL ALVAREZ LARANDEADO  
Dpto. de Oncología - I.N.E.N.  
Médico Coordinador  
Dr. Manuel Alvarez Larandado  
Firma: [Signature]

## Cáncer de Cuello Uterino

55. Shimada M, Kigawa J, Nishimura R, et al. Ovarian metastasis in carcinoma of the uterine cervix. *Gynecol Oncol*. 2006;101:234-237.
56. Keys HM, Bundy BN, Stehman FB, et al. Cisplatin, radiation, and adjuvant hysterectomy compared with radiation and adjuvant hysterectomy for bulky stage IB cervical carcinoma. *N Engl J Med*. 1999;340:1154-1161.
57. Morris M, Eifel PJ, Lu J, et al. Pelvic radiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic and para-aortic radiation for high-risk cervical cancer. *N Engl J Med*. 1999;340:1137-1143.
58. Peters WA, 3rd, Liu PY, Barrett RJ, 2nd, et al. Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. *J Clin Oncol*. 2000;18:1606-1613.
59. Monk BJ, Wang J, Im S, et al. Rethinking the use of radiation and chemotherapy after radical hysterectomy: a clinical-pathologic analysis of a Gynecologic Oncology Group/Southwest Oncology Group/Radiation Therapy Oncology Group trial. *Gynecol Oncol*. 2005;96:721-728.
60. Chernofsky MR, Felix JC, Muderspach LI, et al. Influence of quantity of lymph vascular space invasion on time to recurrence in women with early-stage squamous cancer of the cervix. *Gynecol Oncol*. 2006;100:288-293.
61. Marchiole P, Bueno A, Benchaib M, Nezhat K, Dargent D, Mathevet P. Clinical significance of lympho vascular space involvement and lymph node micrometastases in early-stage cervical cancer: a retrospective case-control surgico-pathological study. *Gynecol Oncol*. 2005;97:727-732.
62. Sedlis A, Bundy BN, Rotman MZ, Lentz SS, Muderspach LI, Zaino RJ. A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy: A Gynecologic Oncology Group Study. *Gynecol Oncol*. 1999;73:177-183.
63. Rotman M, Sedlis A, Piedmonte MR, et al. A phase III randomized trial of postoperative pelvic irradiation in Stage IB cervical carcinoma with poor prognostic features: follow-up of a gynecologic oncology group study. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2006;65:169-176.
64. Bodurka-Bevers D, Morris M, Eifel PJ, et al. Posttherapy surveillance of women with cervical cancer: an outcomes analysis. *Gynecol Oncol*. 2000;78:187-193.
65. Morice P, Deyrolle C, Rey A, et al. Value of routine follow-up procedures for patients with stage I/II cervical cancer treated with combined surgery-radiation therapy. *Ann Oncol*. 2004;15:218-223.
66. Elit L, Fyles AW, Devries MC, Oliver TK, Fung Kee-Fung M. Follow-up for women after treatment for cervical cancer: a systematic review. *Gynecol Oncol*. 2009;114:528-535.
67. Zanagnolo V, Ming L, Gadducci A, et al. Surveillance procedures for patients with cervical carcinoma: a review of the literature. *Int J Gynecol Cancer*. 2009;19:194-201.
68. Chung HH, Jo H, Kang WJ, et al. Clinical impact of integrated PET/CT on the management of suspected cervical cancer recurrence. *Gynecol Oncol*. 2007;104:529-534.
69. Thomas GM, Dembo AJ, Myhr T, Black B, Pringle JF, Rawlings G. Long-term results of concurrent radiation and chemotherapy for carcinoma of the cervix recurrent after surgery. *Int J Gynecol Cancer*. 1993;3:193-198.
70. Berek JS, Howe C, Lagasse LD, Hacker NF. Pelvic exenteration for recurrent gynecologic malignancy: survival and morbidity analysis of the 45-year experience at UCLA. *Gynecol Oncol*. 2005;99:153-159.
71. Goldberg GL, Sukumvanich P, Einstein P, Lagasse LD, Smith HO, Anderson PS, Fields AL. Total pelvic exenteration: the Albert Einstein College of Medicine/Montefiore Medical Center Experience (1987 to 2003). *Gynecol Oncol*. 2006;101:261-268.



72. Morley GW, Hopkins MP, Lindenauer SM, Roberts JA. Pelvic exenteration, University of Michigan: 100 patients at 5 years. *Obstet Gynecol Oncol.* 1989;74:934-943.
73. Maggioni A, Roviglione G, Landoni F, et al. Pelvic exenteration: ten-year experience at the European Institute of Oncology in Milan. *Gynecol Oncol.* 2009;114:64-68.
74. Fleisch MC, Pantke P, Beckmann MW, et al. Predictors for long-term survival after interdisciplinary salvage surgery for advanced or recurrent gynecologic cancers. *J Surg Oncol.* 2007;95:476-484.
75. Tran PT, Su Z, Hara W, Husain A, Teng N, Kapp DS. Long-term survivors using intraoperative radiotherapy for recurrent gynecologic malignancies. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2007;69:504-511.
76. Averette HE, Lichtenberg M, Sevin BU, Gittanner RE. Pelvic exenteration: a 15-year experience in a general metropolitan hospital. *Am J Obstet Gynecol.* 1984;150:179-184.
77. Soper JT, Secord AA, Havrilesky LJ, Berchuck A, Clarke-Pearson DL. Comparison of gracilis and rectus abdominis myocutaneous flap neovaginal reconstruction performed during radical pelvic surgery: flap specific morbidity. *Int J Gynecol Cancer.* 2007;17:298-303.
78. Mithashemi R, Averette HE, Lambrou N, et al. Vaginal reconstruction at the time of pelvic exenteration: a surgical and psychosexual analysis of techniques. *Gynecol Oncol.* 2002;87:39-45.
79. Turns D. Psychosocial issues: pelvic exenterative surgery. *J Surg Oncol.* 2001;76:224-236.
80. Thigpen T, Shingleton H, Homesley H, Lagasse L, Blessing J. Cisplatin in treatment of advanced or recurrent squamous cell carcinoma of the cervix: a phase II study of the Gynecologic Oncology Group. *Cancer.* 1981;48:899-903.
81. Thigpen JT, Blessing JA, DiSaia PJ, Fowler WC, Jr., Hatch KD. A randomized comparison of a rapid versus prolonged (24 hr) infusion of cisplatin in therapy of squamous cell carcinoma of the uterine cervix: a Gynecologic Oncology Group study. *Gynecol Oncol.* 1989;32:198-202.
82. Pectasides D, Kampoiras K, Papaxoinis G, Pectasides E. Chemotherapy for recurrent cervical cancer. *Cancer Treat Rev.* 2008;34:603-613.
83. McGuire WP, 3rd, Arseneau J, Blessing JA, et al. A randomized comparative trial of carboplatin and iproplatin in advanced squamous carcinoma of the uterine cervix: a Gynecologic Oncology Group study. *J Clin Oncol.* 1989;7:1462-1468.
84. Weiss GR, Green S, Hannigan EV, et al. A phase II trial of carboplatin for recurrent or metastatic squamous carcinoma of the uterine cervix: a Southwest Oncology Group study. *Gynecol Oncol.* 1990;39:32-336.
85. Kudelka AP, Winn R, Edwards CL, et al. An update of a phase II study of paclitaxel in advanced or recurrent squamous cell cancer of the cervix. *Anticancer Drugs.* 1997;8:657-661.
86. McGuire WP, Blessing JA, Moore D, Lentz SS, Photopoulos G. Paclitaxel has moderate activity in squamous cervix cancer. A Gynecologic Oncology Group study. *J Clin Oncol.* 1996;14:792-795.
87. Monk BJ, Sill MW, Burger RA, Gray HJ, Buekens TE, Roman LD. Phase II trial of bevacizumab in the treatment of persistent or recurrent squamous cell carcinoma of the cervix: a gynecologic oncology group study. *J Clin Oncol.* 2009;27:1069-1074.
88. Garcia AA, Blessing JA, Vaccarello L, Roman LD. Phase II clinical trial of docetaxel in refractory squamous cell carcinoma of the cervix: a Gynaecological Oncology Group Study. *Am J Clin Oncol.* 2007;30:428-431.
89. van der Burg ME, Monfardini S, Guastalla JP, de Oliveira C, Renard J, Vermorken JB. Phase II study of weekly 4'-epidoxorubicin in patients with metastatic squamous cell cancer of the cervix: an EORTC Gynaecological Cancer Cooperative Group Study. *Eur J Cancer.* 1992;29A:147-148.

## Cáncer de Cuello Uterino

90. Calero F, Rodriguez-Escudero F, Jimeno J, et al. Single agent epirubicin in squamous cell cervical cancer. A phase II trial. *Acta Oncol.* 1991;30:325-327.

91. Look KY, Blessing JA, Gallup DG, Lentz SS. A phase II trial of 5-fluorouracil and high-dose leucovorin in patients with recurrent squamous cell carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group study. *Am J Clin Oncol.* 1996;19:439-441.

92. Schilder RJ, Blessing J, Cohn DE. Evaluation of gemcitabine in previously treated patients with non-squamous cell carcinoma of the cervix: a phase II study of the Gynecologic Oncology Group. *Gynecol Oncol.* 2005;96:103-107.

93. Coleman RE, Harper PG, Gallagher C, et al. A phase II study of ifosfamide in advanced and relapsed carcinoma of the cervix. *Cancer Chemother Pharmacol.* 1986;18:280-283.

94. Sutton GP, Blessing JA, McGuire WP, Patton T, Look KY. Phase II trial of ifosfamide and mesna in patients with advanced or recurrent squamous carcinoma of the cervix who had never received chemotherapy: a Gynecologic Oncology Group study. *Am J Obstet Gynecol.* 1993;168:805-807.

95. Verschraegen CF, Levy T, Kudelka AP, et al. Phase II study of irinotecan in prior chemotherapy-treated squamous cell carcinoma of the cervix. *J Clin Oncol.* 1997;15:625-631.

96. Chen JR, Yang YC, Chen TC, et al. Salvage chemotherapy in recurrent cervical cancer with biweekly pegylated liposomal Doxorubicin (lip-o-dox). *Taiwan J Obstet Gynecol.* 2008;47:322-326.

97. Wagenaar HC, Pecorelli S, Mangioni C, et al. Phase II study of mitomycin-C and cisplatin in disseminated, squamous cell carcinoma of the uterine cervix. A European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Gynecological Cancer Group study. *Eur J Cancer.* 2001;37:1624-1628.

98. Miller DS, Blessing JA, Bodurka DC, Bonebrake AJ, Schorge JO. Evaluation of pemtrexed (Alimta, LY231514) as second line

chemotherapy in persistent or recurrent carcinoma of the cervix: a phase II study of the Gynecologic Oncology Group. *Gynecol Oncol.* 2008;110:65-70.

99. Bookman MA, Blessing JA, Hanjani P, Herzog TJ, Andersen WA.

Topotecan in squamous cell carcinoma of the cervix: A Phase II study of the Gynecologic Oncology Group. *Gynecol Oncol.* 2000;77:446-449.

100. Muderspach LI, Blessing JA, Levenback C, Moore JL, Jr. A Phase II study of topotecan in patients with squamous cell carcinoma of the cervix: a gynecologic oncology group study. *Gynecol Oncol.* 2001;81:213-215.

101. Muggia FM, Blessing JA, Method M, et al. Evaluation of vinorelbine in persistent or recurrent squamous cell carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group study. *Gynecol Oncol.* 2004;92:639-643.

102. Moore DH, Blessing JA, McQuellon RP, et al. Phase III study of cisplatin with or without paclitaxel in stage IVB, recurrent, or persistent squamous cell carcinoma of the cervix: a gynecologic oncology group study. *J Clin Oncol.* 2004;22:3113-3119.

103. Long HJ, 3rd, Bundy BN, Grendys EC, Jr., et al. Randomized phase III trial of cisplatin with or without topotecan in carcinoma of the uterine cervix: a Gynecologic Oncology Group Study. *J Clin Oncol.* 2005;23:4626-4633.

104. Moore DH. Chemotherapy for advanced, recurrent, and metastatic cervical cancer. *J Natl Compr Canc Netw.* 2008;6:53-57.

105. Tao X, Hu W, Ramirez PT, Kavanagh JJ. Chemotherapy for recurrent and metastatic cervical cancer. *Gynecol Oncol.* 2008;110:S67-71.

106. Burnett AF, Roman LD, Garcia AA, Muderspach LI, Brader KR, Morrow CP. A phase II study of gemcitabine and cisplatin in patients with advanced, persistent, or recurrent squamous cell carcinoma of the cervix. *Gynecol Oncol.* 2000;76:63-66.

## Cáncer de Cuello Uterino

107. Sit AS, Kelley JL, Gallion HH, Kunschner AJ, Edwards RP. Paclitaxel and carboplatin for recurrent or persistent cancer of the cervix. *Cancer Invest.* 2004;22:368-373.

108. Tinker AV, Bhagat K, Swenerton KD, Hoskins PJ. Carboplatin and paclitaxel for advanced and recurrent cervical carcinoma: the British Columbia Cancer Agency experience. *Gynecol Oncol.* 2005;98:54-58.

109. Pectasides D, Fountzilas G, Papaxoinis G, et al. Carboplatin and paclitaxel in metastatic or recurrent cervical cancer. *Int J Gynecol Cancer.* 2009;19:777-781.

110. Moore KN, Herzog TJ, Lewin S, et al. A comparison of cisplatin/paclitaxel and carboplatin/paclitaxel in stage IVB, recurrent or persistent cervical cancer. *Gynecol Oncol.* 2007;105:299-303.

111. Gebbia V, Caruso M, Testa A, et al. Vinorelbine and cisplatin for the treatment of recurrent and/or metastatic carcinoma of the uterine cervix. *Oncology.* 2002;63:31-37.

112. Monk BJ, Sill MW, McMeekin DS, et al. Phase III Trial of Four Cisplatin-Containing Doublet Combinations in Stage IVB, Recurrent, or Persistent Cervical Carcinoma: A Gynecologic Oncology Group Study. *J Clin Oncol.* 2009.

113. Monie A, Tsien SW, Hung CF, Wu TC. Therapeutic HPV DNA vaccines. *Expert Rev Vaccines.* 2009;8:1221-1235.

114. Hung CF, Ma B, Monie A, Tsien SW, Wu TC. Therapeutic human papillomavirus vaccines: current clinical trials and future directions. *Expert Opin Biol Ther.* 2008;8:421-439.

115. Gonzalez-Cortijo L, Carballo N, Gonzalez-Martin A, et al. Novel chemotherapy approaches in chemoradiation protocols. *Gynecol Oncol.* 2008;110:S45-48.

116. Poveda A, Gonzalez-Martin A. Multimodality treatment in locoregional gynecological cancer: cervical cancer treatment update. *Ann Oncol.* 2008;19 Suppl 7:vii70-76.

117. Gonzalez Martin A. Molecular biology of cervical cancer. *Clin Transl Oncol.* 2007;9:347-354.

118. Potter R, Haie-Meder C, Van Limbergen E, et al. Recommendations from gynaecological (GYN) GEC-ESTRO working group (II): concepts and terms in 3D image-based treatment planning in cervix cancer brachytherapy-3D dose volume parameters and aspects of 3D image-based anatomy, radiation physics, radiobiology. *Radiother Oncol.* 2006;78:67-77.

119. Haie-Meder C, Potter R, Van Limbergen E, et al. Recommendations from Gynaecological (GYN) GEC-ESTRO Working Group (I): concepts and terms in 3D image based 3D treatment planning in cervix cancer brachytherapy with emphasis on RMN assessment of GTV and CTV. *Radiother Oncol.* 2005;74:235-245.

120. Nag S. Controversies and new developments in gynecologic brachytherapy: image-based intracavitary brachytherapy for cervical carcinoma. *Semin Radiat Oncol.* 2006;16:164-167.

121. Beriwal S, Gan GN, Heron DE, et al. Early clinical outcome with concurrent chemotherapy and extended-field, intensity-modulated radiotherapy for cervical cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2007;68:166-171.

122. Chen MF, Tseng CJ, Tseng CC, Kuo YC, Yu CY, Chen WC. Clinical outcome in posthysterectomy cervical cancer patients treated with concurrent Cisplatin and intensity-modulated pelvic radiotherapy: comparison with conventional radiotherapy. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2007;67:1438-1444.

123. Chen MF, Tseng CJ, Tseng CC, Yu CY, Wu CT, Chen WC. Adjuvant concurrent chemoradiotherapy with intensity-modulated pelvic radiotherapy after surgery for high-risk, early stage cervical cancer patients. *Cancer J.* 2008;14:200-206.

124. Salama JK, Mundt AJ, Roeske J, Mehta N. Preliminary outcome and toxicity report of extended-field, intensity-modulated radiation therapy for gynecologic malignancies. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2006;65:1170-1176.

## Guías de Práctica en Oncología – v.1.2010

## Cáncer de Cuello Uterino

125. Small W, Jr., Mell LK, Anderson P, et al. Consensus guidelines for delineation of clinical target volume for intensity-modulated pelvic radiotherapy in postoperative treatment of endometrial and cervical cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2008;71:428-434.
126. Thomas GM. Improved treatment for cervical cancer--concurrent chemotherapy and radiotherapy. *N Engl J Med.* 1999;340:1198-1200.
127. Whitney CW, Sause W, Bundy BN, et al. Randomized comparison of fluorouracil plus cisplatin versus hydroxyurea as an adjunct to radiation therapy in stage IIb-IVa carcinoma of the cervix with negative para-aortic lymph nodes: a Gynecologic Oncology Group and Southwest Oncology Group study. *J Clin Oncol.* 1999;17:1339-1348.
128. Rose PG, Bundy BN, Watkins EB, et al. Concurrent cisplatin-based radiotherapy and chemotherapy for locally advanced cervical cancer. *N Engl J Med.* 1999;340:1144-1153.
129. Lanciano R, Calkins A, Bundy BN, et al. Randomized comparison of weekly cisplatin or protracted venous infusion of fluorouracil in combination with pelvic radiation in advanced cervix cancer: a gynecologic oncology group study. *J Clin Oncol.* 2005;23:8289-8295.
130. Duenas-Gonzalez A, Zarba JJ, Alcedo JC, et al. A phase III study comparing concurrent gemcitabine (Gem) plus cisplatin (Cis) and radiation followed by adjuvant Gem plus Cis versus concurrent Cis and radiation in patients with stage IIB to IVa carcinoma of the cervix. *J Clin Oncol (Meeting Abstracts).* 2009;27:CRA5507-.
131. Joura EA, Leodolter S, Hernandez-Avila M, et al. Efficacy of a quadrivalent prophylactic human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like-particle vaccine against high-grade vulval and vaginal lesions: a combined analysis of three randomised clinical trials. *Lancet.* 2007;369:1693-1702.
132. Kream SJ, Harper DM. Human papillomavirus types 16 and 18 vaccine (recombinant, AS04 adjuvanted, adsorbed) [Cervarix]. *Drugs.* 2008;68:359-372.

133. Harper DM, Franco EL, Wheeler CM, et al. Sustained efficacy up to 4.5 years of a bivalent L1 virus-like particle vaccine against human papillomavirus types 16 and 18: follow-up from a randomised control trial. *Lancet.* 2006;367:1247-1255.
134. ACOG Committee Opinion No. 344: Human papillomavirus vaccination. *Obstet Gynecol.* 2006;108:699-705.

135. Markowitz LE, Dunne EF, Saraiya M, Lawson HW, Chesson H, Unger ER. Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Recomm Rep.* 2007;56:1-24.

136. Saslow D, Castle PE, Cox JT, et al. American Cancer Society Guideline for human papillomavirus (HPV) vaccine use to prevent cervical cancer and its precursors. *CA Cancer J Clin.* 2007;57:7-28.

137. Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J, Rodriguez AC, Wacholder S. Human papillomavirus and cervical cancer. *Lancet.* 2007;370:890-907.

138. Brown DR, Kjaer SK, Sigurdsson K, et al. The impact of quadrivalent human papillomavirus (HPV; types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like particle vaccine on infection and disease due to oncogenic nonvaccine HPV types in generally HPV-naïve women aged 16-26 years. *J Infect Dis.* 2009;199:926-935.

139. Sadler L, Saftlas A, Wang W, Exeter M, Whittaker J, McCowan L. Treatment for cervical intraepithelial neoplasia and risk of preterm delivery. *JAMA.* 2004;291:2100-2106.

140. Samson SL, Bentley JR, Fahey TJ, McKay DJ, Gill GH. The effect of loop electrosurgical excision procedure on future pregnancy outcome. *Obstet Gynecol.* 2005;105:325-332.

141. Jakobsson M, Gissler M, Sainio S, Paavonen J, Tapper AM. Preterm delivery after surgical treatment for cervical intraepithelial neoplasia. *Obstet Gynecol.* 2007;109:309-313.

142. Sjoberg KD, Vistad I, Myhr SS, et al. Pregnancy outcome after cervical cone excision: a case-control study. *Acta Obstet Gynecol Scand.* 2007;86:423-428.

REF-8

143. Alouini S, Rida K, Mathevet P. Cervical cancer complicating pregnancy: implications of laparoscopic lymphadenectomy. *Gynecol Oncol*. 2008;108:472-477.

144. Takushi M, Moromizato H, Sakamoto K, Kanazawa K. Management of invasive carcinoma of the uterine cervix associated with pregnancy: outcome of intentional delay in treatment. *Gynecol Oncol*. 2002;87:185-189.

145. van de Nieuwenhof HP, van Ham MA, Lotgering FK, Massuger LF. First case of vaginal radical trachelectomy in a pregnant patient. *Int J Gynecol Cancer*. 2008;18:1381-1385.

146. Ben-Ari A, Levy R, Layie O, Edwards C, Kaplan A. Conservative treatment of stage IA2 squamous cell carcinoma of the cervix during pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2004;104:1129-1131.

147. Bader AA, Petru E, Winter R. Long-term follow-up after neoadjuvant chemotherapy for high-risk cervical cancer during pregnancy. *Gynecol Oncol*. 2007;105:269-272.

148. Swenson R. Cancer in the pregnant patient. In: Wu Hoskins CP, RC Young, et al., ed. *Principles and Practice of Gynecologic Oncology*, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

149. Amant F, Van Calsteren K, Halaska MJ, et al. Gynecologic cancers in pregnancy: guidelines of an international consensus meeting. *Int J Gynecol Cancer*. 2009;19 Suppl 1:S1-12.

150. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. *Lancet Oncol*. 2004;5:283-291.

151. Gwyn K. Children exposed to chemotherapy in utero. *J Natl Cancer Inst Monogr*. 2005;69-71.

152. Chan JK, Berek JS. Impact of the human papilloma vaccine on cervical cancer. *J Clin Oncol*. 2007;25:2975-2982.